N XVII Vols. 1-2

B. 1. 3



HALL, BINDER, 33, GEORGE ST OXFORD.

B4AD
889

Flora Danica

FLORÆ DANICÆ
ICONUM

FASCICULUS PRIMUS.

MDCCLXI.

42764

ICONES PLANTARUM

SPONTE NASCENTIUM

IN REGNIS

DANIÆ ET NORVEGIÆ,

IN DUCATIBUS

SLESVICI ET HOLSATIÆ,

ET IN COMITATIBUS

OLDENBURGI ET DELMENHORSTIÆ:

Ad illuſtrandum opus de iisdem Plantis, Regio juſſu exarandum,

FLORÆ DANICÆ

NOMINE INSCRIPTUM;

Editæ ab ejus operis auctore,

GEORGIO CHRISTIANO OEDER,

M. D. PROF. REG. BOTAN.

VOLUMEN PRIMUM,

CONTINENS

FASCICULOS I. II. III.

SEU

TABULAS I—CLXXX.

HAFNIÆ,

Typis CLAUDII PHILIBERTI.

MDCCLXVI.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas primus hic Faſciculus exhibet.

Tab. I.

Chamæmorus Norvagica. Cluſ. Hiſt. 119. cum excerpto ex literis Henrici Hojeri, de facultatibus & conditura hujus plantæ, apud Norvagos. Ab hac non diverſa Chamæmorus anglicana. Ej. l. c. 118.
Chamærubus foliis Ribes. C. B. P. 480.
Chamæmorus Norvagica. S. Paul. Fl. 339. *n.* 189. Barthol. med. dan. 106. Pontopp. H. N. N. I. 215. *c. fig.*
Chamæmorus Raj. Syn. III. 260. Hiſt. 654.
Rubus, Chamæmorus, *foliis ſimplicibus lobatis, caule unifloro.* Linn. S. N. fl. lapp. 208. t. V. fl. ſv. 449.
Norvegis *Multebær*, nomine apud Danos & Germanos recepto.
Locus. Per totam Norvegiam copioſa in alpinis & ſubalpinis, paludoſis, ceſpitoſis, æſtate ſicceſcentibus.

Tab. II.

Pedicularis, lapponica, *caule ſimplici, foliis pinnatifidis ſerratis, calycibus bifidis obtuſis.* Linn. S. N. fl. lapp. 242. t. IV. f. 1. fl. ſvec. I. 507. II. 534.
Locus. Paſſim in alpibus per totam Norvegiam, in ſabuloſis lapilloſis.

Tab. III.

Campanula ſerpyllifolia. C. B. P. 93. prodr. 35. J. B. II. 816. Scheuchz. It. 131. 454.
Nummularia Norvagica. Kylling. Act. Hafn. II. 346. obſ. 130. f. C.
Nummularia ſylveſtris repens flore albo. Pontopp. H. N. N. I. 193.
Serpillifolia. Buxb. Act. Petrop. II. 346.
Linnæa, auctore Gronovio. Linn. gen. 692. Hall. Helv. 608.
Linnæa borealis. Linn. S. N. fl. lapp. 250. t. 12. f. 4. fl. ſv. 562. Kalm. It. II. 263.
Norvegis *Marisle.*
Locus. Per totam Norvegiam locis umbroſis muſcoſis.

Tab. IV.

Alſine alpina glabra. C. B. P. 251. Prodr. 118. 3. J. B. III. 360.
Silene, rupeſtris, *floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis.* Linn. S. N. It. Weſtg. 144.
Locus. In collibus apricis circa *Chriſtiania* & *Kongsberg.*

Tab. V.

Chamæpericlymenum prutenicum. Cluſ. pann. 88. & Ej. *Ch. tenerius aliud ab Henrico Hojero acceptum* Hiſt. 60. *Ch. tertium minus*, Tabernæm. Hiſt. II. 583.
Periclymenum humile Norvegicum. C. B. P. 302. Kyll. vir. 781. 782. Pontopp. H. N. N. I. 194.
Chamæpericlymenum Raj. Syn. III. 261.
Cornus pumila herbacea, chamæpericlymenum dicta. Dill. Elth. 108. t. 91.
Cornus, ſvecica, *herbacea, ramis binis.* Linn. S. N. fl. lapp. 65. t. 5. f. 3.
Norvegis *Skrubbær*, quod jam apud Cluſium, Chriſtianſandenſibus *Hönſebær*, quod etiam Kylling habet.
Locus. Copioſiſſime per totam Norvegiam, in ſylvaticis & dumetis. In Inſula *Mona* Daniæ Kylling.

Tab. VI.

Caryophyllus holoſteus alpinus latifolius. C. B. P. 210. Prodr. 104.
Alſines myoſotis facie Lychnis alpina flore amplo niveo repens. Raj. Syn. III. 349. t. 15. f. 2.
Ceraſtium, alpinum, *foliis ovato lanceolatis, caule diviſo, capſulis oblongis.* Linn. S. N.
Locus. In nemoribus ſubalpinis rarius, *Skremsfield* prope Kongsberg, *Opdal* Nummedaliæ meridionalis.

Tab. VII.

Alſine verna Androſaces capitulis. C. B. P. 251. 15 item 16. 17. Prodr. 118. 5. 6.
Androſace coronopi foliis &c. Amm. rhut. n. 22.
Androſace montana flore minore. Buxb. Act. Petrop. II. 369. t. 23. f. 2.
Androſace, ſeptentrionalis, *foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis, corolla brevioribus.* Linn. S. N. fl. ſv. 170.
Locus. In collibus apricis circa *Chriſtiania,* potiſſimum inſularum ſinus prope portum.

Tab. VIII.

Pyrola IIII. Cluſ. pann. 508. 509. Ej. *IIII. minima* Hiſt. CXVIII.
Pyrola rotundifolia minor. C. B. P. 191. *minima alpina* J. B. III. 536.
Pyrola minima. Aichſt. vern. VI. t. 12. f. 2.
Pyrola flore ſingulari. Riv. pent. 139.
Pirola ſcapo unifloro. Hall. Helv. 420. Goett. 166.
Pyrola, uniflora, *ſcapo unifloro.* Linn. S. N. fl. lapp. 167. fl. ſv. 364.
Sandsverdenſibus circa Kongsberg, *Öjneblomſter.*
Locus. Paſſim in denſis ſylvis, copioſe circa *Kongsberg,* circa *Stören* provinciæ Trundhiemenſis, in via verſus Opdal.

Tab. IX.

Chamæciſtus VII. Cluſ. Hiſt. 75. *Ej. anonymos* pann. 57,
Chamæciſtus ſerpyllifolia floribus carneis. C. B. P. 466.
Chamærhododendros ferruginea ſupina, thymi folio, alpina. Bocc. muſ. 64. t. 53.
Azalea, procumbens, *ramis diffuſo procumbentibus.* Linn. S. N. fl. lapp. 90. t. 6. f. 2. Hall. Helv. 416.
Nummedalenſibus meridionalibus *Högnbrisk.*
Locus. Copioſiſſima in omnium fere alpium Norvegiæ campis, quos latis ceſpitibus veſtit.

Tab. X.

Andromeda, hypnoides, *pedunculis ſolitariis terminalibus, corollis campanulatis, foliis confertis ſubulatis.* Linn. S. N. fl. lapp. 165. t. 1. f. 3.
Locus. Paſſim in alpium Norvegiæ culminibus, eorumque areolis glareoſis, v. g. *Eisfield* Nummedaliæ meridionalis, e regione villæ *Cravik.*

Tab. XI.

Thalictrum montanum minimum præcox foliis ſplendentibus. Moris. Hiſt. III. 325. S. 9. t. 20. f. 14.
Thalictrum, alpinum, *caule ſimpliciſſimo ſubnudo, racemo ſimplici terminali.* Linn. S. N.
Locus. Paſſim in alpibus Norvegiæ ad ſcaturigines, rivulos & ſcopulorum ſtillicidia, v. g. *Præſte Sætter Söndenfields* in *Slidre* nomarchiæ *Walders, Dovrefield* prope diverſorium *Kongsvold.* In Nordlandia in ipſis pratis maritimis uliginoſis, e. g. *Soevigen* inſulæ Alſten Helgelandiæ.

Tab. XII.

Sagina ramis erectis bifloris. Linn. fl. lapp. 158.
Moehringia ſcapis bifloris. Linn. fl. ſv. I. 316. Amoen. Ac. II. 264.
Stellaria, biflora, *foliis ſubulatis, ſcapis ſubbifloris, petalis emarginatis, germinibus oblongis, calycibus ſtriatis.* Linn. S. N. fl. ſv. II. 395.
Locus. Paſſim, ſed rarius, in alpibus Norvegiæ, inter tenuia gramina, e. g. proxime circa Diverſorium *Fogſtue* in *Dovrefield.*

Tab. XIII.

Biſtorta alpina media & minor. C. B. P. 192. 4. 5.
Biſtorta montana minor, radice intorta inodora, floſculis in ſpicæ cacumine albis ſterilibus, inferna ſpicæ parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis foecunda. Amm. rhut. 243.
Biſtorta, foliis ad oram nervoſis, imis ovalibus, ſuperioribus linearibus, ſemine gigartino. Hall. Helv. 179. opuſc. tot. 234. *Conf.* Tournef. Inſt. t. 291. G. H. J. ſpica vivipara Biſtortæ officinalis.
Polygonum, viviparum, *caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis lanceolatis.* Linn. S. N. fl. lapp. 152. fl. ſv. 340.

Walde-

Walderenſibus, *Fieldrug* ; Liſterenſibus, *Storevejgræſs*.
Locus. Per totam Norvegiam vulgatiſſima in paſcuis duris.

Tab. XIV.

Acetoſa rotundifolia alpina. C. B. P. 114. Prodr. 55.
Acetoſa rotundifolia repens eboracenſis, folio in medio deliquium patiente. Moriſ. Hiſt. II. 583. S. 5. t. 36. f. antepenult. Plukn. t. 252. f. 2. Raj. Syn. III. 143. 14.
Acetoſa britannica rotundifolia fructu compreſſo. Blair. miſc. obſ. t. 67.
Lapatum acetoſum, androgynum, folio orbiculari emarginato. Hall. Helv. 170.
Rumex, digynus, *floribus hermaphroditis digynis.* Linn. S. N. fl. ſv. 317.
Locus. Vulgaris in alpibus Norvegiæ, ad rivulos & ſcaturigines.

Tab. XV.

Alga ad mare. Geſn. op. T. I. 120. T. I. f. VII.
Alga anguſtifolia vitriariorum. C. B. P. 364.
Fucus S. Alga marina graminea anguſtifolia ſeminifera ramoſior. Raj. Syn. III. 52. n. 3.
Ruppia foliis linearibus obtuſis. Moehring. Phil. Tr. n. 454. p. 217.
Zoſtera marina. Linn. S. N. It. Weſtg. 166. t. 4. f. 2-5.
Danis & Norvegis vulgo *Tang*; quod quidem nomen commune ipſi eſt cum Fucis; Liſterenſibus ſpeciatim *Malböeg*.
Locus. Creſcit in fundo maris, & ad littora copioſe ubique ab undis rejicitur, at in ſinuum receſſibus tranquilioribus quaſi prata ſubmarina format, v. g. inter Chriſtianſand & Arendal in *Blindeleyde*, & circa *Grömſtad*, circa *Udſteen* ſinus Stavangrenſis, in *Grönneſund* inter *Fauneſiord* Monæ & *Stubbeköping* Falſtriæ.

Tab. XVI.

Teucrium etſcherianum. Cluſ. pann. 616. *Sextum pumilum.* Hiſt. 350.
Veronica quædam foliis glabris. Scheuchz. It. 342. & *petræa Sempervirens*, ib. 428.
Veronica minor alpina ſerpylli folio. Pon. bald. t. 337.
Veronica alpina bugulæ facie calyce villoſo. Hall. Comm. nor. 1732. 300. Helv. 531. 10. t. 12. f. 2.
Veronica, alpina, *corymbo terminali, foliis oppoſitis, calycibus hiſpidis.* Linn. S. N. fl. lapp. 7. t. 9. f. 4.
Locus. Paſſim in alpibus Norvegiæ, graminoſis locis, v. g. *Eisfield* prope *Cravick* Nummedaliæ meridionalis; *Slidre præſteſætter* in Walders.

Tab. XVII.

Gentiana XI. Cluſ. pann. 291. *fugax quinta* Hiſt. 315. 316.
Gentiana humillima, caule ramoſo, tubo floris longiſſimo. Hall. Helv. 475. t. VII.
Gentiana, nivalis, *corollis quinquefidis infundibuliformibus, ramis unifloris alternis.* Linn. S. N. fl. lapp. 204.
Locus. Paſſim in Norvegiæ alpinis paſcuis, e. g. circa *Slidre* in *Walders* ad dextra domus paſtoris, copioſiſſime in *Ranen* Nordlandiæ, potiſſimum in monte *Grönfield*, in Södre Ranen, una cum Lycopodio Selaginoide & Osmunda lunaria.

Tab. XVIII.

1. Figura foliis ſimplicibus
Lunaria racemoſa minor vel vulgaris. C. B. P. 354. *Lunaria racemoſa & botrytis plerorumque antiquorum auctorum.* Blakw. t. 420. S. Paul. fl. 79. n. 67. Kyll. vir. 603.
Osmunda, lunaria, *ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria.* Linn. S. N. ſp. pl. 1064. n. 2. & Hall. Helv. 180.

figuræ foliis compoſitis

2. media
Lunaria racemoſa multifido folio. C. B. P. 354. 3. 4. Breyn. Cent. t. 95.
3. tertia lateralis
Lunaria racemoſa minor adianthi folio. Breyn. l. c. t. 93.
Kyllingio *Maane rude*.
Locus. Paſſim in paſcuis Norvegiæ alpinis ſiccioribus, in Dania S. Pauli & Kylling. Varietates foliis compoſitis a me lectæ circa *Slidre* in Walders, mixtæ vulgari foliis integris, quæ ibi copioſa.

Tab. XIX.

Ranunculus montanus purpureus calyce villoſo Felicis Platerii. J. B. III. 846. Scheuchz. It. 139. t. 20. f. 1.
Ranunculus caule multifloro, calyce floris albi villoſo. Hall. Helv. 326.
Ranunculus primus. Martens Spizb. 43. t. 1. f. D.
Ranunculus, glacialis, *calycibus hirſutis, caule bifloro, foliis multifidis.* Linn. S. N. fl. lapp. 233. t. 3. f. 1.
Incolis diverſorii *Mariſtue* in Fileſield, *Reenſoleye.*
Locus. Paſſim & copioſe in alpium Norvegicarum ſummis culminibus, prope nives perpetuas, ultima fere cum Lichene croceo aëris ætherei incola, omnium copioſiſſime in *Söndenfield* non longe a *Slidre præſteſætter*, item in *Sulutinde* jugi *Fileſield* altiſſimo culmine.

Tab. XX.

Plantula Cardamines æmula. Cluſ. pann. t. 458 & deſc. 459. cum nomine *Sinapi pumilum alpinum.*
Cardamine pumila bellidis folio alpina. Raj. Syn. III. 300.
Cardamine, bellidifolia, *foliis ſimplicibus ovatis integerrimis, petiolis longis.* Linn. S. N. fl. lapp. 260. t. 9. f. 2.
Locus. In alpibus Norvegiæ ad rivulos, rarius, v. g. circa *Slidre præſteſætter in Walders*,

Tab. XXI.

Caryophyllus pumilus alpinus VII. Cluſ. pann. 324.
Lychnis alpina pumila folio gramineo. C. B. P. 206. 4. Dill. Elth. 206. t. 165. f. 206.
Silene acaulis. Linn. fl. lapp. 184. Hall. Helv. 375.
Cucubalus, acaulis, Linn. S. N.
Locus. Vulgatiſſima in alpium Norvegicarum jugis, ubi latos ceſpites format, in Nordlandia cum aliis alpinis copioſiſſima in ipſa inferiore aëris regione in collibus littori maris proximis.

Tab. XXII.

Saxifraga, cernua, *foliis caulinis palmatis petiolatis, caule ſimpliciſſimo unifloro bulbifero.* Linn. S. N. fl. lapp. 172. t. 2. f. 4. fl. ſv. 373.
Locus. Frequens in alpibus Norvegiæ ad rivulos & lapidoſis humidis locis.

Tab. XXIII.

Sedulum alpinum quartum. Geſn. Schmied. Hiſt. faſc. I. n. 36. t. VI.
Sedum montanum hirſutum, mucronato & dentato folio, flore albo guttato. Moriſ. Hiſt. III. 478. S. 12. t. 9. f. 13.
Sanicula myoſotis floribus albicantibus fere umbellatis. Plukn. t. 58. f. 2 & t. 222. f. 4.
Saxifraga foliorum hirſutorum latiore apice dentato, caule nudo ſpicato. Hall. Helv. 400.
Saxifraga, ſtellaris, *foliis ſerratis, caule nudo ramoſo, petalis acuminatis.* Linn. S. N.
Locus. Vulgaris in alpibus Norvegiæ ad rivulos.

Tab. XXIV.

Sedum paluſtre II. Cluſ. pann. 486. t. 487. Hiſt. LIX.
Sedum paluſtre flore incarnato. Aichſt. æſt. XIII. t. 5. f. 2.
Sedum paluſtre ſubhirſutum purpureum. C. B. P. 285. 1.
Sedum purpureum pratenſe. Raj. Syn. III. 270. 4.
Sedum foliis planioribus ellipticis, petiolis ſubhirſutis, in ſummo caule congeſtis. Hall. Helv. 397.
Sedum, villoſum, *caule erecto, foliis planiuſculis pedunculisque ſubpiloſis.* Linn. S. N. ſp. pl. 15.
Locus. Unico loco in Norvegia, ibique copioſe, in *Slidre præſteſætter*, Walders, prope ipſa tuguria, a plaga occidentali.

Tab. XXV.

Echium marinum. Raj. Syn. III. 288. 4. Sibbald. Scot. P. II. L. I. p. 55. t. 12.
Cynogloſſum procumbens glaucophyllum maritimum. Plukn. Alm. 126. t. 172. f. 3.
Cynogloſſum perenne maritimum procumbens. Dill. Elth. 75. t. 65. f. 75.
Pulmonaria, maritima, *calycibus abbreviatis, foliis ovatis, caule ramoſo procumbente.* Linn. S. N. ſp. pl. 5.
Locus. Copioſe in Inſula *Toutteröen* prope Trundhiem, in iſthmo, quo duæ ejus partes connectuntur, item inter *Backland* & *Ladehammer* prope eandem urbem, inter lapides littoris hieme inundati.

Tab.

Tab. XXVI.

Pedicularis alpina folio Ceterach. Helv. fl. 39. t. 39.
Sceptrum Carolinum. Rudbeck. It. dedic.
Pedicularis, ſceptrum carolinum, *caule ſimplici, floribus terno verticillatis, corollis clauſis, calycibus crenatis, capſulis regularibus.* Linn. S. N. fl. lapp. 243. t. 4. f. 4.
Locus. Circa *Röraas* Norvegiæ loco turfoſo uliginoſo.

Tab. XXVII.

Hieracii minoris ſpecie Broccenbergo peculiaris. Thal. herc. 57.
Hieracium pumilum II. Colum. Ecphr. II. 29. t. 30.
Hieracium villoſum alpinum, flore magno ſingulari. Raj. Syn. III. 169. t. 6. f. 2.
Hieracium caule unifloro, calyce & ellipticis foliis longo villo barbatis. Hall. Helv. 744. 8.
Hieracium, alpinum, *foliis oblongis integris dentatis ſcapo nudo unifloro, calyce piloſo.* Linn. S. N.
Locus. Frequens in alpium Norvegiæ campis aridis, copioſiſſima circa *Röraas*, & in *Aalfield* prope *Holtaalen.*

Tab. XXVIII.

Sedulum tertium. Geſn. Schmied. Hiſt. faſc. I. n. 35. t. XI.
Sempervivum minus dentatum. Mart. Spizb. 43. t. F. f. A.
Saxifraga foliis oblongo rotundis dentatis, floribus compactis. Raj. Syn. III. 345. t. XVI. f. 1.
Saxifraga, nivalis, *foliis obovatis crenatis ſubſeſſilibus, caule nudo, floribus congeſtis.* Linn. S. N. fl. lapp. t. 2. f. 5. 6.
Locus. Paſſim ſed rarius in alpibus Norvegiæ, e. g. *Grindefield* prope *Vang* in *Walders*, *Eiskielder* ibidem, mons in Filefield imminens diverſorio, *Fieldſtue*, meridionali, prope villam *Fors* in *Nord-Ranen.*

Tab. XXIX.

Pulſatillæ ſpecies ex Valleſia. Geſn. op. T. 1. p. 122. t. XVI. f. CXXXVIII. IIII.
Pulſatilla lutea apii hortenſis folio. C. B. P. 177.
Anemone tubis caudatis, radicalibus foliis rariter pinnatis, pinnis latis inciſis, caulinis anguſtiſſimis. Hall. Helv. 332. t. 6.
Anemone, vernalis, *pedunculo involucrato, foliis pinnatis, flore erecto.* Linn. S. N.
Guldbrandsdalenſibus, *Giethivel.*
Locus. Circa *Froen* Guldbrandsdaliæ, in inſulis fluvii, omnium copioſiſſime circa *Fogſtuen* in *Dovrefield.*

Tab. XXX.

Pedicularis alpina folio Ceterach. C. B. P. Scheuchz. It. 426. *ſpecies prior.*
Pedicularis caule erecto non ramoſo, pinnis foliorum retroverſis imbricatis. Hall. Helv. 622. 6. t. 16. f. 3.
Pedicularis, flammea, *caule ſimplici, foliis pinnatis retro imbricatis.* Linn. S. N. fl. lapp. 244. t. 4. f. 2.
Locus. *Dovrefield* in via inter *Tofte* & *Fogſtue.*

Tab. XXXI.

Leucas chamædrys alpina quibusdam. Geſn. op. T. I. t. 3. f. 20,
Chamædrys alpina ciſti flore. Cluſ. pann. 610. t. 611. Hiſt. 357. C. B. P. 248. 5.
Chamædrys montana durior. Lob. ic. 495.
Caryophyllata alpina chamædryos folio. Moriſ. Hiſt. II. 432. S. 4. t. 26. f. 9. Raj. Syn. III. 253. Scheuchz. It. 332. 511.
Dryas, octopetala, *foliis ſimplicibus.* Linn. S. N. Hall. Helv. 335.
Locus. Rarior in alpibus Norvegiæ meridionalis, e. g. *Dovrefield* prope *Kongsvold*, in initio deſcenſus per *Vaarſtigen*, at copioſiſſima in Nordlandia, etiam humilioribus & mari vicinis locis, e. g. circa *Sverkerröe* Helgelandiæ, *Broenöen* non longe a domo paſtoris.

Tab. XXXII.

Fragariæ ſylveſtri adfinis planta flore luteo. Sibbald. Scot. P. II. p. 25. med. t. 6. f. 1.
Pentaphylloides fruticoſum minimum procumbens, flore luteo, foliis ſericeis fragariæ ternis. Plukn. alm. t. 212. f. 3.
Pentaphylloides pumila foliis ternis ad extremitates trifidis. Raj. Syn. III. 256.
Sibbaldia, procumbens, *foliolis tridentatis.* Linn. S.N. Hall. Helv. 341.
Locus. Paſſim in alpibus; e. g. copioſe circa *Slidre Præſte ſætter*, in Walders.

Tab. XXXIII.

Uva Urſi. Cluſ. Hiſt. 63. Lob. It. 366. Tournef. Inſt. 599. t. 370.
Arbutus, uva urſi, *caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.* Linn. S. N. fl. lapp. 162. t. 6. f. 3. fl. ſvec. 358. Hall. Helv. 415. 2. Goett. 164.
Norvegis *Meelbær.* Pontopp. H. N. N. I. 125.
Locus. Paſſim copioſe in Norvegia, e. g. *Dovrefield* circa *Fogſtue, Slidre* in Walders, in parva inſula fluvii non longe a domo paſtoris, quæ tota tecta eſt hoc frutice.

Tab. XXXIV.

Sedulis alpinis cognata. Geſn. Schmied. Hiſt. Faſc. I. n. 32. T. IX.
Sedum alpinum ericoides. C. B. P. 216. 16. 17. *purpuraſcens & coeruleum.* Prodr. 132. Scheuchz. It. 140. t. 20. f. 2. 341. 518. Raj. Syn. III, 353. Hall. Helv. 403. n. 11.
Planta ſedo adfinis ſaxatili ſimilis. Mart. Spizb. 46. t. F. f. C.
Saxifraga, oppoſitifolia, *foliis caulinis ovatis oppoſitis imbricatis, ſummis ciliatis.* Linn. S. N. fl. lapp. 179. t. 2 f. 1.
Locus. In alpibus Norvegiæ ex fiſſuris rupium ſtillicidio ſuperiorum irriguis dependens paſſim, e. g. *Filefield* in monte, qui diverſorio orientali imminet, *Dovrefield* circa *Fogſtue.*

Tab. XXXV.

Graminifolia aquatica Thlaſpeos capitulis rotundis, ſepto medio ſiliquam dirimente. Plukn. alm. 180. t. 188. f. 5.
Subularia erecta junci foliis acutis mollibus. Raj. Syn. III. 307.
Alyſſum paluſtre folio junci. Buxb. Act. Petrop. II. 369. t. 23. f. 1.
Subularia, aquatica. Linn. S. N. fl. ſv. 566.
Locus. Paſſim in Norvegia in lacubus ſub aqua, ſolo ſabuloſo, e. g. *Norderhough* in *Ringerike*, in lacu prope templum.

Tab. XXXVI.

Pſeudoaſphodelus pumilus foliis Iridis. Cluſ. pann. 262. Hiſt. 198.
Pſeudoaſphodelus alpinus. C. B. P. 29. X.
Phalangium ſcoticum paluſtre minimum, iridis folio. Tournef. Inſt. Raj. Syn. III. 375.
Aſphodeliris Moehring. Hort. priv.
Anthericum, calyculatum, *foliis enſiformibus, perianthiis trilobis, filamentis glabris.* Linn. S. N. fl. lapp. t. 10. f. 3. fl. ſv. 288. Gmel. Sib. I. 73. t. 18. f. 2.
Locus. Frequens in alpibus Norvegiæ, locis depreſſis humentibus, v. g. circa *Vang* in Walders, ad radicem montis *Grindefield*, in monte *Graakalf* inter Trundhiem & Bynæſſet.

Tab. XXXVII.

Carduus mollior lapathi folio. Cluſ. Hiſt. CLI.
Carduo cirſium minus cambrobritannicum, floribus plurimis ſummo caule congeſtis. Plukn. alm. 83. t. 154. f. 3.
Cirſium foliis triangularibus lunate dentatis, ſubtus tomentoſis, capitulis inermibus, in ſpicam congeſtis. Hall. Helv. 683. t. 22.
Cirſium inerme foliis ex ovato lanceolatis denticulatis lanugine candidis. Gmel. Sib. II. 67. t. 26.
Serratula, alpina, *calycibus ſubhirſutis ovatis.* Linn. S. N. fl. lapp. 291. fl. ſv. 714.
Locus. Paſſim in Norvegia ad latera alpium in nemoribus, copioſe prope *Slidre Præſtegaard*, in latere orientali vallis.

Tab. XXXVIII.

Erica Coris folio 6. Cluſ. Hiſt. 47.
Erica humilis cortice cinereo, arbuti flore. C. B. P. 486.
Erica foliis linearibus ternis, floribus globoſo oblongis laxe ſpicatis. Guettard ſtamp. 2. p. 110.
Erica, cinerea, *antheris bicornibus incluſis, corollis ovatis racemoſis, foliis ternis glabris linearibus.* Linn. S. N. Loefl. It. 10. 137.
Locus. Ingenti copia circa *Evindviig*, provinciæ Bergenſis, circa *Steenſund*, & *Huusöen*, in inſularum ſcopulis & collibus aridis.

Tab. XXXIX.

Anonymos. Geſn. Op. T. I. p. 122. t. XIII. f. CXVII.
Gladiolus ſtagnalis Dortmanni. Cluſ. Cur. poſt. 40. Raj. Syn. III. p. 287.

Leucoium

Leucoium paluſtre flore ſubcoeruleo. C. B. P. 202.
Lobelia, Dortmanna, *foliis linearibus bilocularibus integerrimis, caule ſubnudo.* Linn. S. N. fl. ſv. 783.
Locus. Paſſim in lacubus Norvegiæ, e. g. in *Soloer, Storſöen* paroeciæ *Ström, Treungen* paroeciæ *Hvideſoe Tillemarkiæ,* omnium copioſiſſime inter *Lyngdal* & *Undal* provinciæ Chriſtianſandenſis, locis ſabuloſis in aqua non longe a littoribus.

Tab. XL.

Vitis idaea altera (bucci foliis nec deciduis, baccifque rubris.) Cluſ. pann. 77. t. 79.
Vaccinia rubra. Dodon. Hiſt. 770.
Vitis idaea foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. C. B. P. 470. Tournef. Inſt. Raj. Hiſt. 1488. Kylling Virid. 1090.
Tyltebær. Pontopp. H. N. N. I. 214. c. fig.
Vaccinium, vitis idaea, *racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis.* Linn. S. N. fl. ſv. 334. Hall. Helv. 414. 1. Goett. 163. Rupp. Jen. Hall. 52.
Norvegis & Danis vulgo *Tyttebær.* Danis etiam *Kröſingbær, Kröſslinger.* Kyll.
Locus. Vulgatiſſima in tota Norvegia, in ſylvaticis ſiccis, aſperis, in Siællandia rariſſima. Varietas fructu albo in *Lyngdalen* provinciæ Chriſtianſandenſis.

Tab. XLI.

Papaver erraticum nudicaule flore flavo odorato. Dill. Elth. 302. t. 224. f. 291.
Papaver erraticum luteo flore, capite oblongo hiſpido. Amm. ruth. 61. n. 81.
Papaver, nudicaule, *capſula hiſpida, ſcapo unifloro hiſpido, foliis ſimplicibus pinnato ſinuatis.* Linn. S. N. ſp. pl. 4. Hall. Goet. 88.
Locus. Unico loco nec copioſum in *Dovreſield* prope *Kongsvold,* in principio deſcenſus per *Vaarſtigen,* in præcipitiis ad latus dextrum viæ, initio menſis Julii florens.

Tab. XLII.

Aſphodelus luteus paluſtris. Dod. pemt. 208. Kyll. Vir. 86.
Gramen oſſifragum. Barth. Act. Hafn. II. p. 126. obſ. 43. c. fig. p. 232. IV. p. 99. S. Paul. Quadrip. 529-535. Pontopp. H. N. N. I. 204-207. t. 9.
Narthecium Moehring. Eph. Nat. Cur. 1742. p. 384-400. t. 5. f. 1.
Anthericum, oſſifragum, *foliis enſiformibus, filamentis lanatis.* Linn. S. N.
Stavangrenſibus & Liſterenſibus *Rommegræſs,* item *Liaagræſs.* Pontopp. l. c. *Sturgræſs.*
Locus. In paſcuis humidis per totam Chriſtianſandenſem provinciam adeo copioſe, ut ſi tam eſſet noxium, uti Simoni Paulli narratum fuit, dudum ſane pecoribus incolæ caruiſſent; rarius in reliqua Norvegia, e. g. in monte *Graakalf,* inter Trundhiemum & Bynæſſet, in aſcenſu lateris orientalis, in palude. In Cimbria prope *Wiborg* Kylling.

Tab. XLIII.

Pedicularia genus montanum ex Bokkemato monte. Geſn. op. T. I. t. 6. f. 51.
Clinopodium alpinum. Ponæ bald. 343. J. B. III. 289. c. 64. C. B. P. 225. 5. Plukn. t. 163. f. 5.
Teucrium alpinum coma purpurocoerulea. C. B. P. 247.
Euphraſia rubra Weſtmorlandica, foliis brevibus obtuſis. Raj. Syn. III. 285. 3.
Stæhelina. Hall. Helv. 624.
Bartſia, alpina, *foliis oppoſitis cordatis obtuſe ſerratis.* Linn. S. N.
Locus. Paſſim in alpibus Norvegiæ, ad margines rivulorum, per æſtatem exſiccatorum, e. g. *Eisfield* Nummedaliæ meridionalis; in *Nordlandia* in ipſis pratis & paſcuis turfoſis mari vicinis, e. g. *Soevigen* inſulæ *Alſten,* & in vicina inſula *Sörberroe.*

Tab. XLIV.

Muſcus capillaceus aphyllus, capitulo craſſo bivalvi. Buxb. Cent. 2. p. 8. t. 4. f. 2. Dill. muſc. 477. t. 68. f. 5.
Buxbaumia. Hall. Helv. 10.
Buxbaumia aphylla. Linn. S. N. fl. ſv. 1293. Amoen. ac. V. 78. t. 1. Schmiedel propria diſſertatione.
Locus. Aliquoties in Norvegia legi, in *Næſs* Hallingdaliæ, in nemore ſub rupe, quæ pago ad dextra ſ. verſus occidentem præceps imminet; item in *Lyſager* prope Chriſtiania, ad dextra ponticuli diverſorio

proximi,

proximi, ad declivia latera foſſæ, locis humidis umbroſis, juniorem cum calyptra menſe ſeptembri medio, adultiorem attamen virentem etiamnum menſe Majo.

Tab. XLV.

Blaſia puſilla lichenis pyxidati facie. Mich. Gen. 14. t. 7.
Mnium lichenis facie. Dill. muſc. 237. t. 31. f. 7.
Blaſia puſilla. Linn. S. N.
Locus. Ad radicem montis *Eckeberg* prope Chriſtiania, proxime noſocomio, in humo irrigua farinacea atra ſchiſti aluminoſi, menſis ſeptembris fine.

Tab. XLVI.

Viola montana I. Cluſ. Hiſt. 309.
Viola alpina rotundifolia lutea. C. B. P. 199. Geſn. op. T. I. t. 8. f. 70. A. Plukn. t. 233. f. 7.
Viola flore luteo. Riv. pentap. t. 120.
Viola foliis reniformibus, caulibus folioſis floriferis. Hall. Helv. 502.
Viola, biflora, *caule bifloro, foliis reniformibus ſerratis.* Linn. S. N.
Locus. Paſſim in alpibus Norvegiæ, potiſſimum eorum lateribus & paſcuis nemoroſis, copioſiſſima in *Dovrefield* & aſcenſu a *Sel.* In Inſula Alſten, monte *de ſyv Söſtre*, in paſcuis ad villam *Soevigen* pertinentibus.

Tab. XLVII.

Diapenſia, lapponica, *floribus pedunculatis.* Linn. S. N. fl. lapp. 88. t. 1. f. 1.
Locus. Rarius & ſparſim circa *Fogſtuen* in *Dovrefield*, nec alibi in Norvegia meridionali mihi viſa, at omnium copioſiſſime in Nordlandicæ inſulæ *Alſten* montis *de ſyv Söſtre*, horridis ſcopulis ſparſim & leviter tectis parca humo alpina; copioſe etiam in aliis montibus ſeptentrionalis maritimæ Norvegiæ.

Tab. XLVIII.

Galium, trifidum, *foliis quaternis linearibus, caule procumbente ſcabro, corollis trifidis.* Linn. S. N. ſp. pl. 4. p. 105.
Locus. Unico loco in *Filefield* prope *Mariſtuen*, non longe a domo & a via verſus Walders ducente ad ejus dextra, in humo atra irrigua, crebris lapidibus interſtincta.

Tab. XLIX.

Heptaphyllon. Cluſ. Hiſt. CVIII.
Tormentilla alpina folio ſericeo. C. B. P. 326.
Alchimilla alpina pentaphyllos. Raj. Syn. III. 157.
Alchemilla, alpina, *foliis digitatis ſerratis.* Linn. S. N. Hall. Helv. 185. 2.
Locus. Vulgaris in alpibus Norvegiæ, locis ſiccis apricis.

Tab. L.

Gentiana major flore purpureo. Cluſ. pann. 277. t. 278. Hiſt. 312. C. B. P. 187.
Gentiana foliis imis petiolatis ellipticis, floribus campaniformibus verticillatis. Hall. Helv. 478. 12.
Gentiana, purpurea, *corollis quinquefidis campaniformibus verticillatis, calycibus ſubſpathaceis.* Linn. S. N.
Norvagis, *Söde, Skiærſöde, Södrod*, vulgo *Enzian.*
Locus. Copioſa in alpibus *Hallingdaliæ, Tillemarkiæ, Heckfield*, in lateribus ſummorum collium vix gramine veſtitis, apricis. Luteam nullibi inveni, hujus autem purpureæ radicibus ruſtici utuntur, & effoſſas in urbibus venumdant, luteam ſine dubio æquiparantes, monente jam Cluſio.

Tab. LI.

Aſtragalus alpinus, foliis viciæ, ramoſus & procumbens, flore glomerato oblongo & coeruleo. Scheuchz. It. 509. f. 7. Hall. Helv. 598. 10.
Aſtragalus, alpinus, *ſubcauleſcens procumbens, floribus pendulis racemoſis, leguminibus utrimque acutis piloſis.* Linn. S. N. fl. lapp. 267. t. 9. f. 1.

Locus.

Locus. Paſſim in Norvegia, in pratis & paſcuis ſubalpinis, v. g. in *Froen Guldbrandsdaliæ* prope domum paſtoris, in *Opdal Nummedaliæ* meridionalis, potiſſimum circa villam *Rolland*, in *Leerdal* Bergenſis provinciæ, in inſula, quam fluvius format, ſolo ſicco.

Tab. LII.

Veronica ſpicata minor. C. B. P. 247.
Veronica foliis obtuſis, caule non ramoſo, ſpica nuda terminato. Hall. Helv. 531.
Veronica, ſpicata, *ſpica terminali, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo.* Linn. S. N.
Locus. In Inſularum ſinus Chriſtianenſis collibus apricis.

Tab. LIII.

Boletus eſculentus rugoſus albicans, quaſi fuligine infectus. Tournef. Inſt. 561. t. 329. f. A.
Boletus eſculentus rugoſus. Mich. Gen. t. 85. f. 2. Hall. Helv. 24. n. 3.
Fungus poroſus in longitudinem metæ inſtar excreſcens. C. B. P. 370.
Phallus; capitulo faſtigiato, ſubtus operculato, petiolo nudo. Gleditſch Fung. 59. 4.
Phallus, eſculentus, *pileo ovato ſtipite nudo rugoſo.* Linn. S. N.
Norvagis & Danis, *Morkler.*
Locus. Paſſim in ſylvis aceroſis Norvegiæ meridionalis & orientalis, e. g. *Sandsvær* circa *Kongsberg*, *Bærum* & *Krogskoven* in vicinia Chriſtianiæ. Amat loca præuſta, *Braader.*

Tab. LIV.

Vitis idææ adfinis polifolia montana. J. B. I. 527.
Erica humilis, roſmarini foliis, unedonis flore, capſula ciſtoide. Plukn. t. 175. f. 1.
Ledum paluſtre noſtras arbuti flore. Raj. Syn. III. 472.
Polifolia. Buxb. act. Petrop. II. 345. Cent. V. 28. t. 55. f. 1.
Andromeda, polifolia, *pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis.* Linn. S. N. fl. lapp. t. 1. f. 3. Hall. Helv. 416. 1. Goett. 164.
Locus. Vulgatiſſima per totam Norvegiam in paludibus ſylvaticis ceſpitoſis. In Siælandia circa *Kollekolle* rarius.

Tab. LV.

Pyrola minor. Riv. pentap. t. 136. Raj. Syn. III. 363.
Pirola racemoſa ſtaminibus & piſtillo rectis. Hall. Helv. 420. Goett. 165. Opuſc. bot. p. 82-86.
Pyrola, minor, *floribus racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtilliſque rectis.* Linn. S. N.
Locus. In Norvegiæ ſubalpinis & alpinis ſylvis & dumetis, omnium copioſiſſime in aſcenſu montis *Grindefield* in *Vang Valders.*

Tab. LVI.

Phyllon Dalechampii. Geſn. op. T. I. p. 122. t. XIII. f. CXII.
Sedum petræum montanum. Lob. adv. 163. ic. 381. *Alpinum VI.* Cluſ. pann. 491.
Leucoium luteum aizoides montanum. Col. ecphr. II. 62.
Sedum alpinum hirſutum luteum. C. B. P. 284.
Alyſſon alpinum hirſutum luteum. Tournef. Inſt. Scheuchz. It. 509. t. 12. f. 8.
Draba, alpina, *ſcapo nudo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis.* Linn. S. N. Hall. Helv. 539. 3.
Locus. Rarius in alpibus Norvegiæ, e. g. circa *Fogſtue Dovrefield.*

Tab. LVII.

Erica rarior Norvegica. Burſer. Linn. Amoen. ac. I. 332.
Erica folio abietis, flore arbuti. Buxb. Cent. IV. p. 26. f. 43.
Andromeda, coerulea, *pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis ſparſis linearibus obtuſis planis.* Linn. S. N. fl. lapp. 164. t. 1. f. 5.
Locus. In plerifque alpibus Norvegiæ, e. g. *Eisfieldet* Nummedaliæ meridionalis, *Dovrefield* in aſcenſu e Guldbrandsdalia, & circa *Fogſtuen.*

Tab. LVIII.

Vicia montana minima floſculo purpureo. Burſer. Linn. Amoen. ac. I. 328.
Vicia montana omnium minima. Kyll. vir. 1069.
Vicia, lathyroides, *leguminibus ſeſſilibus ſolitariis erectis glabris, foliolis ſenis, inferioribus obcordatis.* Linn. S. N. ſp. pl. 11.
Locus. Copioſe primo vere in colliculis ſiccis apricis circa Hafniam.

Tab. LIX.

Sedum minus a rupe S. Vincentii. Raj. Syn. III. 270.
Sedum rupeſtre repens foliis compreſſis. Dill. Elth. 343. t. 256. f. 333.
Sedum, rupeſtre, *foliis ſubulatis quinquefariam confertis baſi membranacea ſoluta, floribus cymoſis.* Linn. S. N. fl. ſv. 401.
Locus. Paſſim in provincia Chriſtianſandenſi, potiſſimum ingenti copia in *Aaſerald* ſub *Heckfield,* in ſaxis, ad latera alpium nemoroſa.

Tab. LX.

Filix arborea. Tragi 537.
Filix ſaxatilis corniculata. C. B. P. 358. Tournef. Inſt. Rupp. Jen. Hall. 345.
Acroſtichon, ſeptentrionale, *fronde nuda lineari laciniata.* Linn. S. N. Hall. Helv. 134. Goett. 2.
Incolis circa *Soegne* Chriſtianſandenſis provinciæ *Sant Oles Skiæg.*
Locus. Paſſim in rimis petrarum per totam Norvegiam.


MONITUM.

Rogantur Emtores, qui malunt compactas aſſervare has icones, quam Herbarii in modum ſolutas, ut expectare ſaltim velint Faſciculum quintum, qui complebit primum harum Iconum Tomum, & quocum juſtus & prolixior integro Tomo præfigendus Titulus comparebit.

HAFNIÆ, typis Fratrum C. & A. PHILIBERT.
Proſtat apud Auctorem & Bibliopolas PHILIBERT & ACKERMANN.







Flora Danica Tab. IV.






Flora Danica. Tab. VI.



Flora Danica. Tab. VII.



Flora Danica, Tab. VIII.



Flora Danica T: IX.



Flora Danica. Tab. X.






Flora Danica Tab. XII.





Flora Danica Tab. XIV.





Flora Danica Tab. XVI.



Flora Danica. Tab. XVII.




Flora Danica. Tab. XVIII.



1



2



3



Flora Danica Tab. XX.



Flora Danica Tab XXI.



Flora Danica Tab. XXII



Flora Danica Tab. XXIII.



Flora Danica. Tab. XXIV.











Flora Danica. Tab. XXVIII.





Flora Danica. Tab. XXX.



Flora Danica. Tab. XXXI.



Flora Danica Tab. XXXII.



Flora Danica Tab. XXXIII.



Flora Danica Tab. XXXIV.



Flora Danica T: XXXV



Flora Danica. Tab. XXXVI.



Flora Danica Tab. XXXVII.



Flora Danica. Tab. XXXVIII.



Flora Danica. Tab: XXXIX.



Flora Danica Tab. XL.



Flora Danica. Tab. XLI.




Flora Danica. Tab. XLII.






Flora Danica Tab. XXXXIV.



Flora Danica. Tab. XLV.





Flora Danica Tab. XLVII



Flora Danica, Tab. XLVIII.










Flora Danica. Tab. LII.



Flora Danica. Tab. LIII.




Flora Danica Tab. LIV.



Flora Danica. Tab. LV.



Flora Danica Tab. LVI.



Flora Danica, Tab. LVII.



Flora Danica Tab. LVIII.





Flora Danica. Tab. LX.



FLORÆ DANICÆ
ICONUM
FASCICULUS SECUNDUS.

MDCCLXIII.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas ſecundus hic Faſciculus exhibet.

Tab. LXI.

Cacalia tomentoſa. C. B. Prodr. 102. Pin. 198. Scheuchz. It. II. 130. t. 18. f. 1.
Petaſites ſcapo paucifloro, foliis ſubtus tomentoſis albiſſimis. Hall. Helv. 707.
Tuſſilago, frigida, *thyrſo faſtigiato, floribus radiatis.* Linn. S. N.
Locus. Non rara in irriguis ſylvaticis convallibus alpium Norvegicarum, e. g. prope *Röraas,* copioſe in monte *Grönfield i Leerskarret i Sör-Ranen.*

Tab. LXII.

Draba tertia ſucculenta. Cluſ. pann. 463. 464. Hiſt. CXXV.
Heſperidi alpinæ ſive murariæ affinis draba ſucculenta. J. B. II. 880. 881.
Arabis caule ſimplici foliis ovatis utrimque denticulatis. Linn. lapp. 257.
Arabis, alpina, *foliis amplexicaulibus dentatis.* Linn. Cliff. 335. S. N. Sp. pl. 1. *a.* Hall. Helv. 561. 1. *a.*
Locus. Paſſim in alpibus Norvegiæ, locis humidis, circa *Fogſtue, Dovrefield,* in monte *Grindefield i Vang i Valders.*

Tab. LXIII.

Doronicum auſtriacum quartum. Cluſ. pann. 520.
Chryſanthemum latifolium. Dod. Pemt. 263. S. Paul. Fl. D. 200. 50. Quadrip. 258.
Doronicum plantaginis folio alterum. C. B. P. 185. Kyll. Vir. 35.
Doronicum foliis oblongo ovalibus. Linn. lapp. 304.
Arnica foliis ovatis integris conjugatis. Hall Helv. 737.
Arnica, montana, *foliis ovatis integris, caulinis geminis oppoſitis.* Linn. S. N. Sp. pl. 1. *a.* Ström. Sundm. I. 73. Jacq. Vindob. 286.
Arnica officinalis. Schröderi Pharmacop.
Vulgo Danice & Germanice *Wolverlej.* *Guldblomme* Kyll. Norvegis circa Bielland *Heſteblomme,* Liſterenſibus *Grönſokblom,* i. e. S. Hans Blom. Floſ. S. Joannis. Sundmörenſibus *Heſteſoloje, Stokſvæbe, Oellkonge.* Ström.
Locus. Copioſiſſime per totam Chriſtianſandenſem provinciam, item circa *Flensburg,* in Siællandia rarius, in apricis paſcuis aſperis.

Tab. LXIV.

Anagallis ſerpyllifolia aquatica. J. B. III. 372.
Alſine paluſtris minor ſerpyllifolia. C. B. Prodr. 118. Kyll. vir. 7.
Glaux paluſtris flore ſtriato clauſo. J. R. H. Vaill. Par. 80. t. 15. f. 5.
Portula. Dill. Giſſ. 239. 240. app. 133. t. 7.
Glaucoides paluſtre portulacæ folio, flore purpureo. Mich. Gen. 21. t. 18.
Peplis. Linn. lapp. 128. ſv. 312. Hall. Helv. 406. Gœtt. 160.
Peplis, portula, *floribus apetalis.* Linn. Sp. pl. II. 474.
Locus. Paſſim circa Hafniam locis inundatis, omnium copioſiſſime in *Kollekolle,* in Sylva verſus meridiem ſita, non longe a foſſis ceſpitoſis.

Tab. LXV.

Silene lapponica alpina facie viſcariæ. Linn. lapp. 185.
Silene floribus in capitulum congeſtis. Hall. Helv. 376. t. 7.
Lychnis, alpina, *petalis bifidis, floribus corymboſis.* Linn. Sp. pl. II. 626.
Locus. Paſſim in Norvegiæ alpibus, e. g. monte *Söndenfield* pertinente ad *Slidre Præſteſetter i Walders, Dovrefield* non longe a *Fogſtue* in Sylvula.

Tab. LXVI.

Sedum minus fœmina. Fuchſ. 35.
Sedum minus I. Cluſ. Hiſt. LVIII. Lob. ic. 377. Dod. pemt. 129. Blakw. 428.
Sedum minus teretifolium album. C. B. P. Tournef. Pariſ. I. 250.
Sedum, album, *foliis oblongis, obtuſis, teretiuſculis, ſeſſilibus, patentibus, cyma ramoſa.* Linn. Sp. pl. II. 619. Hall. Helv. 398.
Locus. In collibus apricis inſularum ſinus Chriſtianenſis prope urbem.

T A B. LXVII.

Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis. C. B. Prodr. 101. Pin. 193. Kyll. vir. 129.
Potamogetoni affinis graminifolia aquatica. Ray Hiſt. I. 190. Syn. III. 135. Plukn. t. 102. f. 7.
Algoides vulgaris. Vaill. Act. Par. 1719. p. 15. t. 1. f. 1.
Aponogeton. Ponted. Anthol. 117.
Zannichellia paluſtris &c. Mich. Gen. 71. t. 34. Hall. Helv. 198.
Zannichellia paluſtris. Linn. S. N.
Locus. Paſſim in foſſis circa Hafniam, v. g. in foſſa ſeu rivulo prope Charlottenlund non longe a porta verſus mare decurrente.

T A B. LXVIII.

Saxifraga, cujus Synonymia difficillime extricatur, videtur autem ob petala emarginata, etſi folia differant, eſſe *petræa* Ponæ, in Cluſ. Hiſt. CCCXXXVII. quæ nunc eſt Linnæi *Saxifraga* petræa. Spec. pl. II. 578. saxifraga adscendens. L. v. Cyc. —
Locus. Legi in ſcopulis circa Chriſtiania.

T A B. LXIX.

Plantago aquatica minima. Cluſ. Hiſt. CX.
Plantaginella paluſtris. C. B. P. 190. Plukn. t. 74. f. 4.
Plantaginella. Rupp. Jen. ed. Hall. 23. t. 6.
Limoſella aquatica. Linn. S. N. fl. ſv. 563.
Locus. Paſſim circa Hafniam & alibi in Siællandia, locis ubi aqua hyemalis detinetur, ſubſabuloſis.

T A B. LXX.

Muſcus terreſtris repens clavis ſingularibus folioſis erectis. Scheuchz. It. I. 43. t. 6. f. 1.
Selaginoides foliis ſpinoſis. Raj. Syn. III. 106. Hall. Helv. 94. t. 3. f. 1. Dill. muſc. 460. t. 68.
Lycopodium, ſelaginoides, *foliis ſparſis ciliatis, ſpicis ſolitariis terminalibus folioſis.* Linn. S. N. fl. ſv. 953. Ström. Sundm. I. 105.
Locus. Paſſim in Norvegiæ paſcuis ſubalpinis ſiccioribus, e. g. in *Slidre Walders*, in orientali latere vallis, in *Leerskarret Sör-Ranen* in pratis circa ultimam villam.

T A B. LXXI.

An *Saxifraga tridactylites Groenlandica cauliculis valde folioſis.* Dill. Elth. 337. t. 253. f. 329?
An *Saxifraga ceſpitoſa.* Linn. Sp. pl. II. 578? an ſatis inter ſe differunt *Groenlandica* & *ceſpitoſa?*
Nihil auſim affirmare in tantis difficultatibus quibus ſynonymia harum Saxifragarum tridactyliteon laborat. Certo eadem cum noſtra eſt
Saxifraga foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque. Ström Sundm. I. 123. qui adeo agnovit pro *S. ceſpitoſa* Linnæi. v. S. palmata. Cyc. —
Locus. Rarior in alpibus Norvegicis, in *Grindefield i Vang i Valders, Dovrefield* circa *Fogſtue* & *Kongsvold.*

T A B. LXXII.

Sedula montana pulchra, mas & fœmina. Geſn. Schmied. Op. I. 130. tab. acceſſ. f. IV. 1. 2. & Hiſt. faſc. I. n. 38. S. aizoides. Cyc. —
Sedum alpinum floribus luteis maculoſis. C. B. P. 284.
Saxifraga foliorum margine ciliari, floribus luteis maculoſis. Hall Helv. 399.
Saxifraga, autumnalis, *foliis caulinis linearibus alternis ciliaribus: radicalibus aggregatis.* Linn. Sp. pl. II. 575. Scopol. Carn. 493. Jacquin Vindob. 71. 240. Ström Sundm. I. 123.
Locus. Frequens in Norvegia in alpinis & ſubalpinis irriguis, in umbroſis & ſylvaticis pallido flore productior flaccida, copioſiſſime per totam vallem *Guldalen* provinciæ Nidroſienſis.

T A B. LXXIII.

Vitis idæa prior. Cluſ. pann. 77. 78. Hiſt. 61.
Arbutus, alpina, *caulibus procumbentibus*, *foliis rugoſis ſerratis.* Linn. Sp. pl. II. 566. fl. ſv. 359. Hall. Helv. 415. Ström. Sundm. I. 73.
Vulgo Norvegis alpicolis *Heſtebær*, Heckfieldenſibus *Rypebær.*
Locus. Frequens in alpibus Norvegiæ.

T A B. LXXIV.

Digitalis purpurea. Fuchſ. 893. Dod. pemt. 169. S. Pauli flor. dan. 220. 70. Hort. Aichſt. Aeſt. Ord. 1. t. 1. 2. Riv. 103. Blakw. 16.
Digitalis purpurea folio aſpero. C. B. P. 243.
Digitalis, purpurea, *calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtuſis, labio ſuperiore integro.* Linn. S. N. Ström. Sundm. 85.

Danice

Danice *Fingerurt*, *Fingerbölle*, S. Paul. Liſterenſibus *Rebbiöller*, it. *Robiöller*, it. *Rævebioller*. *Fingerhat*, *Rævebielde*, Ström. Germanice, *Fingerhut*, *Fingerhutkraut*.

Locus. Frequens in Norvegiæ provinciis *Chriſtianſandenſi* & *Bergenſi*, ad ſaxa, aggeres viarum, & ruderata.

Tab. LXXV.

Hypericum exiguum pulchrum. Trag. 74. J. B. III. 383.

Hypericum minus erectum. C. B. P. 279. Kyll. Vir. 72.

Hypericum foliorum baſi latiſſima, foliis calycis brevioribus obtuſis. Hall. Helv. 361. Gœtt. 116.

Hypericum foliis cordatis connatis, laciniis calycinis ovato obtuſis. Guett. Stamp. II. 175.

Hypericum, pulchrum, *floribus trigynis, calycibus ſerrato glanduloſis, foliis cordatis glabris, bracteis integerrimis, caule terete.* Linn. S. N. Ström Sundm. 98?

Locus. Paſſim ſed parcius circa *Vandsöe*, in Inſula Liſterenſi *Sandöe, Stavanger*, in Inſula *Udſteen*, in Inſulis circa *Evindviig*, ſolo ſaxoſo. In *Fionia* Kyll.

Tab. LXXVI.

Juncus floridus minor. C. B. prodr. 23. 9. Theatr. 190. Pin. 12.

Juncoidi affinis paluſtris. Scheuchz. Agroſt. 336.

Scheuchzeria, paluſtris. Linn. Sp. pl. II. 482. Fl. lapp. 133. t. 10. f. 1. Hall. Helv. 258. Gmel. Sib. I. 73.

Locus. Paſſim in Norvegia, e. g. copioſe in palude ſylvatica *Soukiær* dicta pertinente ad villam *Gorter* in *Elverum*, rarius circa Hafniam prope *Silleröd*.

Tab. LXXVII.

Serapias batrachites vel myodes. Lob. Ic. 193.

Orchis palmata flore viridi. C. B. Prodr. 30. Pin. 86. Raj. Cantabrig. 107. Kyll. Vir. 113.

Orchis radicibus palmatis labello biſulco, mucrone ex diviſione eminente, calcare breviſſimo. Hall. Helv. 270. Segu. Ver. II. t. 6. f. 18.

Satyrium, viride, *bulbis palmatis, foliis oblongis obtuſis, nectarii labio trifido lineari, intermedia obſoleta.* Linn. S. N. Ström Sundm. 122.

Locus. Paſſim at parcius in Norvegiæ pratis aſperis ſubalpinis, e. g. circa *Röraas*. In Gyldenlund Kylling, ipſe nondum obſervavi.

Tab. LXXVIII.

Lycopodium, complanatum, *foliis bifariis connatis, ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis pedunculatis.* Linn. S. N. fl. ſv. 958. Ström Sundm. 106.

Norvegis vulgo *Jamne*.

Locus. Paſſim in Norvegiæ aſperis ſylvaticis ſubalpinis, e. g. copioſe circa *Elverum Oeſterdaliæ*.

Tab. LXXIX.

Lycopodium, alpinum, *foliis quadrifariam imbricatis acutis, ſurculis erectis dichotomis, ſpicis ſeſſilibus teretibus.* Linn. S. N. fl. lapp. 417. t. 11. f. 6. fl. ſv. 957. Dill. muſc. t. 58. f. 2. Hall. Helv. 93. 3.

Comprehenditur etiam hæc ab alpicolis Nummedaliæ meridionalis nomine *Jamne*.

Locus. In ſummis alpium Norvegicarum culminibus ad ſaxa, paſſim, e. g. in monte *Thronen* in *Tönſet Oeſterdaliæ*.

Tab. LXXX.

Oxycoccum. Cord. II. c. 63.

Vitis idæa paluſtris. C. B. P. 470. Kyll. Vir. 172.

Oxycoccus. Tournef. I. R. H. 655. t. 431. Hall. Helv. 413.

Vaccinium, oxycoccos, *foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis.* Linn. Sp. pl. II. 500. Ström Sundm. I. 133. Pontopp. H. N. I. 213.

Danis & Norvegis vulgo *Tranebær*. Liſterenſibus *Myrebær*, Heckfieldenſ. *Strandbær*.

Locus. Frequens in Dania & Norvegia in humo tremula paludum ſphagno obtectarum.

Tab. LXXXI.

Erica XIII. Cluſ. hiſt. 46.

Erica ex rubro nigricans ſcoparia. C. B. P. 486. Kyll. Vir. 39. 286?

Tetralix. Rupp. Jen. ed. Hall. 39. a. Hall. Gœtt. 164.

Erica, tetralix, *antheris bicornibus incluſis, corollis ſubgloboſis confertis folio* (calyce) *longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus.* Linn. Sp. pl. II. 502. Ström Sundm. I. 87.

Norvegis Heckfieldenſibus *Poſe-blom.* Liſterenſ. *Soupatter.*
Locus. Copioſiſſime in tota provincia *Chriſtianſandenſi,* nec alibi infrequens, etiam in *Siællandia,* mixta Ericæ vulgari.

Tab. LXXXII.

An *Sedum minimum non acre flore albo.* Raj. Syn. III. 270. t. 12. f. 2?
An *Sedum ſaxatile atrorubentibus floribus.* C. B. Prodr. 132?
Conf. Synonyma ſub Hall. Helv. 396. 10. & Linnæi *Sedo rubente* Sp. pl. II. 619.
Locus. Copioſe in ſcopulis maritimis per *Chriſtianſandenſem* provinciam, potiſſimum circa *Stavanger* & *Udſteen,* etiam circa *Chriſtianiâ* & *Laurvig,* ſed rarius, nec vidi niſi in maritimis.

Tab. LXXXIII.

Viola paluſtris rotundifolia glabra. Moriſ. II. 475.
Viola pratenſis rotundifolia flore cinereo minore. Kyll. Vir. 160?
Viola, paluſtris, *acaulis foliis reniformibus.* Linn. S. N. fl. ſv. 786. Hall. Helv. 501. Ström Sundm. I. 136.
Locus. In pratis ſubhumidis Daniæ & Norvegiæ, non rara.

Tab. LXXXIV.

Alſinanthemum. Thal. herc. 15. Schwenckf. Sil. 17. Oelhaf. Ged. Hall. Gœtt. 203. Op. bot. 122.
Herba trientalis. J. B. III. 536.
Pyrola alſines flore. C. B. Prodr. 100. Kyll. Vir. 132.
Trientalis, europæa, *foliis lanceolatis integerrimis.* Linn. Sp. pl. II. 488. Ström Sundm. I. 131.
Norvegis Stavangrenſibus *Stierneblomme,* Valderenſibus *Viidſömme.*
Locus. Omnium copioſiſſima in tota Norvegia, in omnibus ſylvis & locis aſperis, in Siællandia rarius circa *Kollekolle,* circa *Friedensburg,* in inſula *Mona.*

Tab. LXXXV.

Trachelium majus belgarum. Cluſ. Hiſt. CLXXII.
Campanula maxima foliis latiſſimis. B. B. P. 94.
Campanula pulchra a Toſſano Carolo miſſa. J. B. II. 807.
Campanula, latifolia, *foliis ovatolanceolatis, caule ſimpliciſſimo tereti, floribus ſolitariis pedunculatis, fructibus cernuis.* Linn. Sp. pl. II. 233. Ström Sundm. I. 79.
Norvegis *Gobler.*
Locus. Paſſim in Norvegia ad radices montium nemoroſas, e. g. ad radices montis *Skredsfield* inter *Edsvold* & *Toten,* in *Lyngdal* prope trajectum in *Liſter,* in ſubalpinis ſub *Heckfield* Chriſtianſandenſis provinciæ & in parœcia *Spind* copioſe.

Tab. LXXXVI.

Polygonatum anguſtifolium. Fuchſ. 586.
Polygonatum anguſtifolium non ramoſum. C. B. P. 303. Kyll. Vir. 124.
Polygonatum foliis verticillatis. Hall. Helv. 288.
Convallaria, verticillata, *foliis verticillatis.* Linn. Sp. pl. II. 451. Ström Sundm. I. 83.
Norvegis Heckfieldenſibus *Beengræſs,* Voſſenſibus, Nummedalenſibus, Tellemarkenſibus *Seentogsroed.*
Locus. Frequens in Norvegiæ ſylvis & nemoribus ſubalpinis, locis humidis, ſaxoſis, umbroſis. In Dania ipſe nondum vidi.

Tab. LXXXVII.

Limnopeuce. Cord. 150. Vaill. Act. Pariſ. 1719. t. 1. f. 3. Hall. Helv. 197.
Equiſetum paluſtre brevioribus foliis polyſpermum. C. B. P. 15. Kyll. Vir. 38.
Hippuris vulgaris. Linn. Sp. pl. II. 6.
Locus. Frequens in Dania & Norvegia, in aqua quietius fluente, nec ſtagnante, profundiore, ſolo limoſo.

Tab. LXXXVIII.

Anagallis flore phœniceo. C. B. P. 252. S. Pauli fl. dan. 162. 12. Theod. Holm lib. propr. c. fig. Kyll. Vir. 8.
Anagallis, arvenſis, *foliis indiviſis caule procumbente.* Linn. Sp. pl. II. 211. Hall. Helv. 481.
Danica nomina Kyllingii, *Gaaſeheel, Rödarve, Grine ved Dag, Grine ved Middag.* Inter Germanica varia receptiſſimum *Gauchheil.*
Locus. Vulgatiſſima in Dania in agris. In Norvegia non memini me obſervare.

Tab.

Tab. LXXXIX.

Sium minimum foliis imis ferulaceis. Moriſ. III. 283. ſ. 9. t. 5. f. 5. Plukn. t. 61. f. 3.
Siſon, inundatum, *repens umbellis bifidis.* Linn. Sp. pl. II. 363. It. Scan. 397.
Locus. Paſſim circa Hafniam, copioſe in *Kollekolle*, item prope *Faxöe*, in pratorum locis depreſſis inundatis.

Tab. XC.

Cotyledon paluſtris. Dod. pemt. 133. Lob. ic. 387.
Ranunculus aquaticus cotyledonis folio. C. B. P. 180. Kyll. Vir. 137.
Hydrocotyle, vulgaris, *foliis peltatis, umbellis quinqueflorus.* Linn. Sp. pl. II. 338. Hall. Helv. 425.
Locus. Frequens in Dania, in paludoſis ſylvaticis, e. g. in *Charlottenlund.*

Tab. XCI.

Betula pumila. Thal. Herc. 20. Hall. Gœtt. 10.
Betula humilis rotundifolia. Burſ. Act. Upſ. 1724. Kyll. Vir. 15.
Betula pumila foliis ſubrotundis. Amm. ruth. 180. Act. petrop. IX. 314. t. 14.
Betula, nana, *foliis orbiculatis crenatis.* Linn. S. N. fl. lapp. 342. t. 6. f. 4. Am. ac. I. 4. ſq. t. 1. Hall. Helv. 158. Ström Sundm. 76.
Norvegis vulgo *Fieldrapp.* Heckfieldenſibus *Biörkvesla*, i. e. Betula nana. *Birkepors.* Ström.
Locus. In omnibus alpibus Norvegiæ, quarum campos obtegit.

Tab. XCII.

Stellaria, cujus ſynonyma nulla adſcribere audeo.
Locus. In alpinis in *Voſs* verſus Hardanger ſpectantibus, inter glaream lapilloſque, ſatis ibi copioſe, nec alibi.

Tab. XCIII.

Pinguicula. Cluſ. pann. 360. Hiſt. 310. J. B. III. 546. S. Pauli flor. dan. 320. 170. Kyll. Vir. 122.
Pinguicula, vulgaris, *nectarii labio cylindraceo longitudine petali.* Linn. Sp. pl. II. 25. Hall. Helv. 611. Ström Sundm. I. 111.
Danice *Wibefit, Haarvæxt.* Kyll. Norvegis vulgo *Tettegræſs*, Sundmœrenſibus *Mælkekors.* Ström.
Locus. In uliginoſis ubique in Norvegia, ſatim etiam frequens in Dania, & circa Hafniam.

Tab. XCIV.

Moſchatella. Cord. Hiſt. 172.
Ranunculus nemoroſus moſchatellina dictus. C. B. P. 178. Kyll. Vir. 135.
Fumaria bulboſa minima. Tabern. Hiſt. I. 90.
Moſchatellina. Tournef. Inſt. 156. t. 68. Hall. Helv. 412.
Adoxa, Moſchatellina. Linn. Sp. pl. II. 527. fl. ſv. 347.
Danice *Desmerurt, Desmerknap.* Kyll. Germanice *Biſamkraut, Waldrauch.* Bœhm. Lipſ.
Locus. Frequens in Dania in nemoribus umbroſis.

Tab. XCV.

Vicia ſegetum ſingularibus ſiliquis glabris. C. B. P. 345. Kyll. Vir. 168.
Cracca minor ſiliquis gemellis. Riv. tetrap. t. 53.
Vicia foliis linearibus, ſiliquis obtuſis polyſpermis. Hall. Helv. 601.
Ervum, tetraſpermum, *pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis quaternis.* Linn. S. N.
Danice, *Tadder*, cum alio de more ſecundum Bauhinianum ficto, Kylling.
Locus. Frequens in Dania, in agris.

Tab. XCVI.

Alſine nodoſa germanica. C. B. Prodr. 118. Pin. 251. Plukn. t. 7. f. 4. Kyll. Vir. 7.
Alſine foliis faſciculatis, petiolis ſimplicibus, petalis integris. Hall. Helv. 388.
Spergula, nodoſa, *foliis oppoſitis ſubulatis laevibus, caulibus ſimplicibus.* Linn. Sp. pl. II. 630.
Locus. Sat frequens in Dania, in paludoſis, & campis depreſſis exſiccatis, e. g. in Amager non longe a porta; in Norvegia rarior, e. g. in inſulis prope *Vandsöe.*

Tab. XCVII.

Sanguiſorba major. Fuchſ. 788.
Pimpinella ſanguiſorba major. C. B. P. 160. S. Paul. fl. dan. 107. 95.
Pimpinella tetraſtemon, foliis oblonge cordatis, ſpica brevi. Hall. Helv. 469.
Sanguiſorba, officinalis, *ſpicis ovatis.* Linn. Sp. pl. II. 169.
Pimpinella ſanguiſorba officinis.
Danice *Pimpinelle, Quæſs-urt, Backerod,* S. Paul. Liſterenſibus, *Röd Pimpernelle.* Germanice, *Bibernell, Blutkraut, Wieſenknöpfe.* Rapp. Jen.
Locus. Copioſe in pratis circa *Stavanger,* in *Jeddern,* circa *Vandsöe,* aliisque locis in Occidentali parte provinciæ Chriſtianſandenſis.

Tab. XCVIII.

Vicia multiflora caſſubica fruteſcens, lentis ſiliqua. Breyn. Prodr. I. 32. Plukn. t. 72. f. 2.
Vicia pedunculis multifloris caule fruticoſo. Linn. Cliff. 368.
Vicia, caſſubica, *pedunculis ſubſexfloris; foliolis denis ovatis acutis, ſtipulis integris.* Linn. S. N.
Locus. Circa *Stavanger,* in Inſula *Udſteen,* circa *Vandsöe,* ſiccis aſperis locis.

Tab. XCIX.

Lonchitis minor. C. B. P. 359. Dod. pemt. 469. Cluſ. Hiſt. CCXXIII. Kyll. Vir. 87.
Spicant Tragi & germanorum. Rupp. Jen. ed. Hall. 346.
Struthiopteris. Hall. Helv. 132. Gœtt. 2. Bœhm. Lipſ. 724. Scopol. Carn. 168.
Oſmunda, ſpicant, *frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciniis conniventibus integerrimis parallelis.* Linn. S. N. fl. ſv. 936. Ström Sundm. 110.
Liſterenſibus *Lunſegræſs.* Sundmörenſibus *Biörnkam.* Ström.
Locus. Paſſim in Norvegiæ ſylvis aſperis, copioſiſſime in *Guldalen* provinciæ Nidroſienſis. In Siællandia Kyll. circa *Silleröd & Fridrichsthal.*

Tab. C.

Hederaceum thlaſpi. Lob. Hiſt. 338. ic. 615. Raj. Syn. III. 303. n. 5.
Cochlearia minor erecta, & Danica repens. C. B. Prodr. 53. Pin. 110. S. Paul. Fl. D. 207. 57. 208. 58. Kyll. Vir. 29. 30.
Cochlearia, Danica, *foliis haſtatis angulatis.* Linn. S. N.
Locus. Frequens in Daniæ maritimis, e. g. ante Hafniæ portam Amagrienſem verſus *Pröveſteen* omnium copioſiſſime.

Tab. CI.

Chamæciſtus I. Cluſ. Hiſt. 73.
Chamæciſtus vulgaris flore luteo. C. B. P. 465. Kyll. Vir. 25.
Helianthenum foliis ſubhirſutis, omnibus longe ellipticis. Hall. Helv. 358.
Ciſtus, helianthemum, *ſuffruticoſus, procumbens, ſtipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis ſubpiloſis.* Linn. Sp. pl. II. 744.
Danice *Soelblomſter* Kyllingio, neſcio an vernaculo nec potius de more ejus ad græcum helianthemum ficto nomine. Germanice *Heyden-Yſop, Kirſch-Yſop, Sonnenginſel.* Rupp. Bœhm.
Locus. Frequens in Dania in pratis & paſcuis aridis.

Tab. CII.

Orchis puſilla pallida odorata VI. Cluſ. pann. 239. Kyll. Vir. 114.
Orchis parva autumnalis lutea. J. B. III. 768.
Orchis odorata moſchata ſive monorchis. C. B. Prodr. 84.
Monorchis. Mich. Gen. 30. t. 26. Segu. ver. II. 131. 22. t. 16. f. 15.
Orchis radicibus ſubrotundis, calcare nullo, labello trifido. Hall. Gœtt. 63. Helv. 269. n. 10. Op. bot. 90. ſq.
Ophrys, monorchis, *bulbo globoſo, ſcapo nudo, nectarii labio trifido.* Linn. S. N.
Danice *Sygsknap, Hörnings-urt.* Kyll.
Locus. Paſſim in pratis ſubuliginoſis circa Hafniam, e. g. *Lundhuus.*

Tab. CIII.

Orchis anthropophora oreades. Col. eophr. 318–320.
Orchis flore nudi hominis effigiem repræſentans. C. B. P. 82. Kyll. Vir. 114. 756. Vaill. Pariſ. 147.

Ophrys,

Ophrys, anthropophora, *bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nectarii labio lineari tripartito: medio elongato bifido.* Linn. S. N.
Locus. Rarior lecta circa *Selleröd* & *Charlottenlund* loco paludoſo.

Tab. CIV.

Berglapp vel ſpica alpina, vel muſcus idæus. Geſn. Schmied. Op. I. 129. tab. acceſſ. f. 3.
Selago tertia. Thal. herc. 116. Schwenkf. Sileſ. 141.
Selago vulgaris abietis rubræ facie. Rupp. Jen. ed. Hall. 386. Hall. Helv. 94. Dill. Muſc. 435. t. 56. f. 1.
Lycopodium, ſelago, *foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis.* Linn. S. N. fl. ſv. 955. Am. Ac. II. 293. §. 6. Ström Sundm. 105.
Norvegis Valderenſibus *Roegræſs*, Sundmœrenſibus *Lumbergræſs*, *Vippegræs*, *Roſagræs.* Ström.
Locus. Paſſim in Norvegiæ ſylvis etiam alpibus. In Siællandia circa *Fridrichsthal.*

Tab. CV.

Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnaſcens. C. B. P. 374.
Funguli calyciformes ſeminiferi. Kyll. Vir. 51.
Peziza calyciformis lentifera lævis. Dill. Giſ. 195.
Cyathoides cinereum hirſutum. Mich. Gen. 122. t. 102. f. Hall. Helv. 18. Vaill. Par. 56. t. 11. f. 6. 7.
Peziza, ſeſſilis, corpore campanulato integerrimo. Gleditſch Meth. fung. 137.
Peziza, lentifera, *campanulata lentifera.* Linn. S. N.
Locus. In lignis ſeneſcentibus.

Tab. CVI.

Fucus marinus quartus. Dod. pemt. 480.
Fucus anguſtifolius veſiculis longis ſiliquarum æmulis. Raj. Hiſt. 73. Syn. III. 48. Kyll. Vir. 46. 336.
Fucus, ſiliquoſus, *teres ramoſiſſimus, pedunculis alternis, veſiculis oblongis acuminatis.* Linn. S. N. Ström. Sundm. 90.
Liſterenſibus *Knoptang.*
Locus. Frequens in Norvegia ad littera rejectus, etiam inter Hafniam & Helſingöer.

Tab. CVII.

Juncus acumine reflexo minor vel trifidus. C. B. Prodr. 22.
Juncus trifidus. J. B. III. 521.
Juncoides alpinum trifidum. Scheuchz. Agroſt. 325.
Juncus, trifidus, *culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus.* Linn. Sp. pl. II. 465. Hall. Helv. 253. 10.
Locus. Frequens in alpibus Norvegiæ, in humo alpina irrigua.

Tab. CVIII.

Ranunculus flammeus minimus, ſpergulæ facie. Buxb. Cent. V. 48. App. f. 41.
Ranunculus repens, gramineis foliis, e ſingulis geniculis radices agens. Amm. ruth. 80. t. 13. f. 1.
Ranunculus, reptans, *foliis linearibus, caule reponte.* Linn. Sp. pl. II. 773. fl. lapp. 236. t. 3. f. 5.
Locus. Frequens in Norvegia ad ripas arenoſas fluviorum & lacuum. In vicinia Hafniæ prope *Corporals-Kro.*

Tab. CIX.

Cirſium britannicum II. Cluſ. pann. 657. Hiſt. CXLVIII. Raj. Syn. III. 193. 2.
Cirſium foliis longe lanceolatis ſerratis ſubtus tomentoſis. Hall. Helv. 683. t. 21.
Carduus, heterophyllus, *caule ſubunifloro, calyce inermi acuto, foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque.* Linn. S. N. fl. ſv. I. 657. II. 721. Gorter Ingr. 128. Ström Sundm. I. 79.
Norvegis Valderenſibus *Hviidſide*, Voſſenſibus *Heſteſkiære*, Sundmœrenſibus *Ulve-Liim*, *Hvid-Blad*, Heckfieldenſibus *Biodnſturt*, i. e. herba urſi.
Locus. Frequens in Norvegiæ pratis humidis ſylvaticis.

Tab. CX.

Pyrola rotundifolia major. C. B. P. 191. S. Paul. flor. dan. 326. Kyll. Vir. 132.
Pyrola. Riv. pentap. irr. t. 136.
Pyrola, rotundifolia, *ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato.* Linn. Sp. pl. II. 567. Hall. Helv. 420. Gœtt. 165. Op. bot. 82. ſq. Ström Sundm. 117.
Danice *Wintergrön, Winterlilie, Wundlilie.* Kyll. Germanice *Wintergrün, Wald-Mangold.* Rupp.
Locus. In ſylvis aſperis umbroſis, frequentior in Norvegia, e. g. copioſiſſime in *Klemetſane* prope *Trundhiem,* rarior in Dania, prope Hafniam in *Fridrichsthal.*

Tab. CXI.

Ranunculus IIII. alpinus major albo flore. Cluſ. pann. 369. 370. Hiſt. 236.
Ranunculus montanus aconiti folio. C. B. P.
Ranunculus, aconitifolius, *foliis omnibus quinatis lanceolatis, inciſo ſerratis.* Linn. Sp. pl. II. 776. Hall. Helv. 325. Ström Sundm. 117.
Norvegis Nummedaliæ meridionalis *Römmegræſs.*
Locus. Paſſim & copioſe in Norvegiæ ſylvis ſubalpinis, e. g. in *Eisfield* Nummedaliæ, in *Opdal* ſub *Dovrefield.*

Tab. CXII.

Chamæmeſpilus Geſneri. Cluſ. Hiſt. 60. nec Pann. 84.
Cotoneaſter folio rotundo non ſerrato. C. B. P. 452. J. B. I. 73.
Meſpilus folio rotundiori, non ſerrato, fructu nigro. Amm. ruth. 279. t. 34.
Meſpilus foliis ovatis integerrimis. Hall. Helv. 352. Gœtt. 111.
Meſpilus, Cotoneaſter, *inermis foliis ovatis integerrimis.* Linn. Sp. pl. II. 686. fl. ſv. 438.
Locus. Paſſim in collibus apricis ſiccis littoris & inſularum ſinus Chriſtianenſis. Inter Danicas Holm fl. dan. Linn. Am. ac. V. 43.

Tab. CXIII.

Sedum minus mas. Fuchſ. Hiſt. 33.
Sempervivum minus I. Dod. pemt. 128. Lob. ic. 378. J. B. II. 692.
Sedum minus luteum folio acuto. C. B. P. 283. Tournef. Pariſ. I. 250.
Sedum foliis teretibus in ſpinulam terminatis, umbella ſparſa. Hall. Helv. 397.
Sedum, reflexum, *foliis ſubulatis ſparſis baſi ſolutis: inferioribus recurvatis.* Linn. Sp. pl. II. 618. fl. ſv. 1296.
Gallorum *Tripemadame* ou *Triquemadame.* Tournef. l. c.
Locus. In Norvegia rarius in ſcopulis maritimis circa *Chriſtiania, Laurvig, Grömſtad.*

Tab. CXIV.

Quinquefolium tertium aureo flore. Cluſ. pan. 427. Hiſt. CV.
Quinquefolium minus repens alpinum aureum. C. B. P. 325.
Potentilla foliis quinatis, acute ſerratis, ora ſericea, petalis maculatis. Hall. Helv. 339. t. 6. f. 4.
Potentilla, aurea, *foliis radicalibus quinatis ſerratis acuminatis ; caulinis ternatis: caule declinato.* Linn. Sp. pl. II. 712. Am. Ac. IV. 316. Jacq. Vind. 245.
Locus. Paſſim & copioſe in Norvegiæ alpibus eorumque lateribus, potiſſimum per provinciam Bergenſem in *Voſs* & *Filefield,* prope *Mariſtue.*

Tab. CXV.

Orchis palmata montana latifolia, floribus in ſpica denſis, albis, tantillo luteo admixto. Raj. europ. 400.
Orchis palmata flore albo minimo. Kyll. Vir. 114?
Limodurum montanum flore albo dilute vireſcente. Chomel. Act. Pariſ. 1705. 517.
Pſeudo-orchis alpina, flore herbaceo. Mich. Gen. 30. t. 26.
Orchis radicibus multis, cylindricis, labello trifido, calcare breviſſimo. Hall. Helv. 270. Gœtt. 64. Op. bot. 148. §. 141.
Satyrium, albidum, *bulbis faſciculatis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido acuto: intermedia majore.* Linn. S. N. It. Scan. 153. Jacq. Vindob. 294. Ström Sundm. I. 122.
Locus. Semel in Norvegia legi in *Aaſerald* Chriſtianſandenſis provinciæ ſub jugo *Heckfield* in præcipiti latere montis alicujus non longe a villa *Aasland.*

Tab. CXVI.

Fungoides fungiforme criſpum laciniatum & varie complicatum, pediculo craſſo ſtriato & rimoſo. Mich. Gen. 204. t. 86. f. 7.
Bolatus petiolo rugoſo, pileo latiſſimo laciniato. Hall. Helv. 23.

Elvela,

Elvela, petiolata, lamina in formam capituli deorſum plicato-laciniata & criſpa; petiolo fiſtuloſo, ſtriato & rimoſo. Gleditſch meth. fung. 36.
Elvela, Mitra, *pileo deflexo adnato lobato difformi.* Linn. S. N. Ström Sundm. I. 85.
Germanice *Falſche Morchel.* Gleditſch.
Locus. In Norvegia mixta Phallo eſculento. Circa Hafniam in *Fridrichsthal,* in penitis horti regii *Fridrichsbergenſis.*

TAB. CXVII.

Herba facie pyrolæ. Mart. Spitzb. 47. t. G. f. B.
Salix ſaxatilis minima. C. B. Prodr. 159.
Salix, herbacea, *foliis ſerratis glabris orbiculatis.* Linn. S. N. fl. lapp. 355. t. 8. f. h. & t. 7. f. 3. 4. fl. ſv. 887. Hall. Helv. 154. Jacq. Vindob. 296. Ström Sundm. I. 121.
Locus. Frequens in alpium Norvegicarum culminibus, in humo irrigua glareoſa.

TAB. CXVIII.

Saxifraga, rivularis, *foliis caulinis palmatis: ſummo florali ovato, caule ſimplici ſubbifloro.* Linn. Sp. pl. II. 577. fl. lapp. 174. t. 2. f. 7.
Locus. Paſſim in Norvegiæ alpibus elatioribus, ad rivulos & in rimis petrarum ſtillicidio e ſuperioribus ſaxis expoſitarum.

TAB. CXIX.

Trichomanes. Fuchſ. Hiſt. 796. Trag. 530.
Trichomanes S. polytrichum officinarum. C. B. Prodr. 356. Tournef. Inſt. 539. t. 315. Plum. fil. am. præf. XXVI. t. 6. f. 1.
Aſplenium, Trichomanes, *frondibus pinnatis, pinnis ſubrotundis erenatis.* Linn. S. N. Hall. Helv. 135. Ström Sundm. I. 74. Bœhm. fl. Lipſ. 716.
Officinis *adianthum rubrum.* Geofr. M. M. III. 32. 35.
Germanice *Wiedertod, güldner Wiederthon, Steinbrech.* Rupp.
Locus. Vulgatiſſima in Norvegia, in rimis petrarum, rarius in Siællandia, prope *Lyngby* inter ſaxa aggeris verſus *Oerholm.*

TAB. CXX.

Juncus, biglumis, *folio ſubulato, gluma biflora terminali.* Linn. Sp. pl. 467. Am. ac. II. 266. t. 3. f. 3.
Locus. Rarius in alpibus Norvegiæ, e. g. *Söndenfield* prope *Slidre Præſteſetter* in aſcenſu ſummi culminis in humo madida; circa *Evindviig* Provinciæ Bergenſis loco ſubalpino paludoſo.

MONITUM.

Repetendas mihi video breviter rationes in Programmate de edendo opere expoſitas, quarum cauſſa ſejunctus a textu prodeat iconum hic apparatus. Nempe non omnibus, qui plantarum ſtudio tenentur, res domeſticæ permittunt, ut ſibi comparent hunc iconum apparatum, quo cum igitur oportebat non conjungere nexu indiſſolubili partes eas operis, quas promiſimus, verbis expoſitam plantarum doctrinam contenturas. Dein opus erat in partes diſpeſcere paullatim edendas apparatum iconum, mole ſua & ſumtuum pretiique cumulo obruiturum emtores pariter & editores, ſi una totum ſiſtere voluiſſemus, ne vero hoc modo in nimis longos annos & ultra noſtram adeo ætatem protraheretur editio iconum, conſultum erat initium ejus facere quam primum licebat. Nefas autem fuiſſet & abſonum pari modo in totidem particulas dirimere & disjicere textum, cum hæc præ reliquis plantarum diſciplina in bona methodo fere conſiſtat tota, nec niſi ſyſtematis ope aut peritioribus via per regnum vegetabile aut tyronibus aditus adeo pateat.

Hæc cum ita ſint rogavi & rogo etiam atque etiam emtores & judices hujus apparatus iconum, ut eum recipiant & conſiderent tanquam herbarium ſ. plantarum ſiccarum collectionem, aut tanquam mapparum geographicarum ſyllogem, ad illuſtrationem Geographiæ cujus velis utilem, & ut ſint memores, ſcopum mihi & conſilium hoc loco, dum hos iconum faſciculos edo, alium nullum eſſe,

 quam

quam ſiſtendi plantarum nobis indigenarum nitidas & fideles imagines. Jam his imaginibus ſuus eſt uſus & pretium unum idemque, quodcunque botanicum ſyſtema ſequaris, & ſi vel nullam lineolam addidiſſem, ſaltem, uti factum eſt, inſculptis in ipſas tabulas numeris, in omnium botanicorum uſus cedere poterant, ab omnibus citari commemoratione numeri tabulæ cujusvis. Dein ſi aut proprium a me cuſum, aut inter auctorum ſynonyma ſelectum & pro meo adoptatum nomen, ſive in ipſa tabula inſculptum, ſive in his quas adjicio plagulis propoſuiſſem, quid inde accedere iconi aut pretii aut ad intellectum adjumenti poterat, neque enim nominibus memoria rerum & ſcientia nititur, ſed nomina cum ipſa tota ſcientia innituntur iconibus & deſcriptionibus? Nunc per me licet appellare plantam aliquam aut quo quisque adſuetus eſt nomine, aut ſi cui lubuerit novo, modo ſit quocum connecti & cui quaſi inſcribi & inhærere poſſint omnia hæc nomina, plantæ invariabile monumentum, & modo ſimus memores, vix ſperari poſſe, ut nomina, quæ in ſcriptis botanicorum adeo diverſa & in diem mutata, etſi non ſine incommodo ferri tamen poſſunt, extra botanicorum ſcripta & in conſuetudinem loquendi uſus tyrannus recipiat, neque adeo poſtulari id poſſe, ſi verum fateri velimus, quamdiu non datur, quod nunquam dabitur, affinitatum quæ plantis intercedunt, diſcrimina, ſeu generum ſive ſuperiorum ſive inferiorum limites ſtatuere invariabiles, quos nec ipſe eorum ſtator ſubinde migret, & alii ut agnoſcant eosdem adduci & argumentis ſatis validis cogi adeo poſſint.

Citationes auctorum, quas exhibent adjectæ unicuique faſciculo plagulæ, eum ſolum in finem addo, ut conferri icones noſtræ poſſint cum ſcriptis botanicorum, & profiteor palam, nullum me adgnoſcere eorum nominum, quæ excito ordine potiſſimum chronologico diſpoſitorum, pro meo, idque profeſſus iterum rogo omnes, quibus placebit Floræ Danicæ in ſcriptis ſuis mentionem facere, ne aliter icones noſtras citare velint quam commemorando numerum tabulæ cuilibet inſcriptum, ſpeciatim autem Illuſtrem Linnæum, quem pro meritis ita veneror tantum virum, ut nolim quidquam eſſe quod intercedat, enixe rogo, ne velit pergere, uti cœpit in nova editione libri *Species plantarum* inſcripti, citando floram danicam eo modo, ut illud nomen, quod primam lineam in nomenclatura mea occupat, mihi adſcribat, etiam omiſſa mentione libri unde petitum eſt, quaſi a me præadamatum, quo citandi modo ſane id efficit, ut qui ejus ſolum librum vident, vix poſſint aliter quam iniquius de me judicare, & ſi forte in hac citandi ratione ſequi ſe debere putat propriam legem *Philoſ. botan.* §. 319. ægre ne ferat opponentem legi in re arbitraria, ſcribendi methodo, latæ jus illud naturale, quo unicuique interpretem propriæ ſententiæ eſſe licet.

G. C. OEDER.

HAFNIÆ, typis Fratrum C. & A. PHILIBERT.

Proſtat apud Auctorem & Bibliopolas Fratres PHILIBERT & Viduam MUMME.






Flora Danica Tab. LXIII.




Flora Danica Tab. LXIV.



Flora Danica Tab. LXV.



Flora Danica Tab. LXVI.





Flora Danica Tab. LXVIII.



Flora Danica Tab. LXIX.



Flora Danica Tab. LXX.



Flora Danica. Tab. LXXI.



Flora Danica Tab. LXXII.







Flora Danica Tab. LXXV.





Flora Danica Tab. LXXVII.









Flora Danica Tab. LXXX.



Flora Danica Tab. LXXXI.



Flora Danica Tab. LXXXII.



Flora Danica. Tab. LXXXIII.




Flora Danica Tab. LXXXIV.












Flora Danica Tab. LXXXVIII.



Flora Danica Tab. LXXXIX.



Flora Danica Tab. XC.



Flora Danica Tab. XCI



Flora Danica Tab. XCII.




Flora Danica Tab. XCIII.



Flora Danica Tab. XCIV.



Flora Danica Tab. XCV.



Flora Danica. Tab. XCVI.



Flora Danica Tab. XCVII.






Flora Danica Tab. XCIX.



Flora Danica Tab. C.



Flora Danica. Tab. CI.








Flora Danica Tab. CIV



Flora Danica Tab. CV.





Flora Danica Tab. CVII.



Flora Danica Tab. CVIII.





Flora Danica Tab. CX.









Flora Danica. Tab. CXIV.



Flora Danica Tab. CXV.



Flora Danica Tab. CXVI.



Flora Danica Tab. CXVII.




Flora Danica. Tab. CXVIII.



Flora Danica. Tab. CXIX.



Flora Danica Tab. CXX.



FLORÆ DANICÆ

ICONUM

FASCICULUS TERTIUS.

MDCCLXIV.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas tertius hic Faſciculus exhibet.

Tab. CXXI.

Prunella hyſſopi folio viridi, amplo flore cœruleo. Moriſ. Hiſt. III. 364. ſ. 11. t. 5. f. 9.
Pſeudochamæpithys. Riv. monop. irr. t. 74.
Ruyſchiana flore cœruleo magno. Boerh. Lugd. I. 172. Amm. ruth. 50.
Dracocephalum, Ruyſchiana, *floribus ſpicatis, foliis bracteisque lanceolatis indiviſis muticis.* Linn. Sp. pl. II. 830. Upſ. 165. Goüan Monſp. 291.
Locus. In Inſulis prope *Chriſtiania* & circa *Slidre* in Walders, in paſcuis elatis, circa lapidum acervos & virgulta.

Tab. CXXII.

Plantago aquatica humilis anguſtifolia. J. B. III. 778. Lobel. Ic. 300.
Damaſonium anguſtiſſimo plantaginis folio. Vaill. Act. Pariſ. 1719. p. 35.
Aliſma, ranunculoides, *foliis lineari lanceolatis, fructibus globoſo ſquarroſis.* Linn. Sp. pl. II. 487.
Locus. Paſſim copioſe, prope *Peblingerſöe; Molendinam Neſtvedienſem; Rodbylillekobbel ved Stege paa Möen.*

Tab. CXXIII.

Aconitum foliis peltatis multifidis hiſpidis, petalo ſupremo cylindraceo. Linn. lapp. 221. Gort. Ingr. 84.
Aconitum, lycoctonum, *foliis palmatis multifidis villoſis.* Linn. Sp. pl. II. 750. Ström Sundm. I. 67.
Floribus conſtanter violaceis cœruleisve, nec unquam luteis in Norvegia, in Suecia, in Ruſſia inventum nonne differat ab auctorum *Aconito lycoctono luteo?* An noſtrum fuerit *Aconitum lycoctonum Judenbergenſe.* Cluſ. Hiſt. XCVII?
Norvegis *Luushat. Luſegræs* Sundmörenſibus. *Torjong* Hierdalenſibus Tellemarkiæ.
Locus. Vulgatiſſimum per totam Norvegiam, potiſſimum in ſubalpinis ſylvis.

Tab. CXXIV.

Geranium ſecundum batrachyoides minus. Cluſ. pann. 417. Hiſt. XCIX.
Geranium batrachiodes folio aconiti. C. B. P. 717. Kyll. vir.
Geranium batrachiodes montanum noſtras. Raj. Hiſt. 1062.
Geranium, foliis rugoſis, ſemitrilobis, latioribus, lobis dentatis, lateralibus bipartitis, floribus purpureis. Hall. Helv. 367.
Geranium, ſylvaticum, *pedunculis bifloris, foliis ſubpeltatis quinque lobis inciſo-ſerratis, caule erecto, petalis emarginatis.* Linn. Sp. pl. II. 954. fl. ſv. 617. Goüan. Monſp. 242. Ström. Sundm. I. 96.
Danice *Storkenæb.* Norvegis Liſterenſibus *Skovöye.* Germ. *Storchſchnabel.*
Locus. Vulgatiſſimum in Norvegiæ ſylvaticis, albo flore prope *Stören,* nec rarum in Dania.

Tab. CXXV.

Primula veris rubro flore. Cluſ. pann. 340. Hiſt. 300. cf. Geſn. Schmied. op. I. T. XXII. f. CXC.
Verbaſculum alpinum umbellatum. C. B. P. 242. Kyll. vir.
Primula, farinoſa, *foliis crenatis glabris, florum limbo plano.* Linn. Sp. pl. II. 205. Hall. Helv. 484.
Danice *Engeſtierne, Blaamdy.* Kyll.
Locus. In Norvegiæ alpinis, in Daniæ uliginoſis, vulgaris.

Tab. CXXVI.

Muſcus lignoſus vel urſinus. Geſn. Schmied. op. I. 129. t. acceſſ. f. II.
Muſcus terreſtris clavatus. Dod. pemt. 472. C. B. P. 360. Kyll. vir.
Lycopodium vulgare piloſum, anfractuoſum & repens. Dill. Muſc. 441. t. 58. f. 1.
Lycopodium, clavatum, *foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculis geminis.* Linn. Sp. pl. II. 1564. Hall. Helv. 92. Ström Sundm. I. 105.
Lycopodium offic.
Danice *Jordmuſs, Ulvefoed,* Kyll. *Kragefoed* Sundmörenſibus. *Rævereνer* Liſterenſibus. Germ. *Bærlap, Wolfsklauen, Gintelkraut &c.* Rupp.
Locus. Vulgaris in ſylvis Norvegiæ, rarior in Danica, paſſim in Cronburger Amt.

Tab. CXXVII.

Muſcus terreſtris foliis retro reflexis. J. B. III. 759.
Muſcus clavatus, juniperinis foliis reflexis, clavis ſingularibus ſine pediculis. Moriſ. Hiſt. III. 624. ſ. 15. t. 5. f. 3.
Lycopodium elatius juniperinum, clavis ſingularibus ſine pediculis. Dill. Muſc. 455. t. 63. f. 9.
Lycopodium, annotinum, *foliis ſparſis quinquefariis ſubſerratis, ſurculis annotino articulatis, ſpicis terminalibus glabris erectis.* Linn. Sp. pl. II. 1566. fl. ſv. 956. Hall. Helv. 93. Ström Sundm. I. 106.
Norvegis Sundmörenſibus *Vippegræs.*
Locus. Paſſim in Norvegiæ ſylvis denſis aceroſis.

Tab. CXXVIII.

Aparine aquis innatans treviſana, foliis perchepier capreolis donata. Bocc. Muſ. I. p. 23. t. 4.
Millefolium paluſtre galericulatum minus. Plukn. t. 99. f. 6.
Lentibularia minor. Ray. Syn. III. * 286. Hudſ. angl. 8.
Utricularia, minor, *nectario carinato.* Linn. Sp. pl. II. 26. fl. ſv. 29.
Locus. Paſſim in lacunis a ceſpite effoſſo circa Hafniam.

Tab. CXXIX.

Stellaria aquatica. Lob. Ic. 792. C. B. P. 141. Ray. Cantabr. 160.
Stellaria foliis omnibus ſubrotundis. Hall. Helv. 199. Gœtt. 39.
Callitriche, verna, *foliis ſuperioribus ovalibus, floribus androgynis.* Linn. Sp. pl. II. 6. fl. ſv. 3. Goüan. Monſp. 4.
Locus. Vulgaris in foſſis & aquis quietis.

Tab. CXXX.

Leucoium ſeu lunaria vaſculo oblongo intorto. Plukn. t. 42. f. 1. Ray. Syn. III. 291. Hudſ. angl. 244.
Draba, incana, *foliis caulinis numeroſis incanis, ſiliculis oblongis obliquis.* Linn. Sp. pl. II. 897. It. Gotl. 192. fl. ſv. 568. Ström. Sundm. I. 85.
Locus. Paſſim in ſubalpinis Norvegiæ, copioſiſſime in *Fröen Guldbrandsdaliæ.*

Tab. CXXXI.

Alſineformis paludoſa tricarpos, floribus albis inapertis. Plukn. t. 7. f. 5. Vaill. Pariſ. p. 10. t. 3. f. 4.
Cameraria aquatica & arvenſis minor. Dill. E. N. C. Cent. VI. app. T. X. fl. giſſ. 46. app. t. 6. cf. Camer. Hort. 131.
Montia aquatica minor. Mich. Gen. 18. t. 13. f. 2.
Montia fontana. Linn. Sp. pl. II. 129. fl. ſv. 115. Hall. Helv. 608. Ström Sundm. I. 108.
Locus. Vulgaris in Norvegia & Dania ad ſcaturigines.

Tab. CXXXII.

Juncus exiguus montanus mucrone carens. C. B. Prodr. 22. Pin. 12.
Juncus, triglumis, *foliis planis, gluma triflora terminali.* Linn. Sp. pl. II. 467. fl. lapp. t. 10. f. 5. fl. ſv. 306.
Locus. In alpibus Norvegiæ.

Tab. CXXXIII.

Ranunculus flore globoſo. Dod. pemt. 430. Lob. Ic. 675. Cluſ. Hiſt. 237.
Ranunculus globoſus. Kyll. vir.
Helleborus uniflorus petalis & ſiliquis plurimis. Hall. Helv. 318.
Trollius, europæus, *corollis conniventibus, nectariis longitudine ſtaminum.* Linn. Sp. pl. II. 782.
Danice *Engeblomme, Kabbeleye* Kyll. Norvegis *Bollerblomſter.*
Locus. Vulgaris in pratis ſylvaticis Daniæ & Norvegiæ, etiam in alpibus.

Tab. CXXXIV.

Chamæbatus ſ. Rubus idæus alter. Trag. Hiſt. 973.
Rubus ſaxatilis alpinus. Cluſ. pann. 115. Hiſt. CXVII.
Chamærubus ſaxatilis. C. B. P. 110. Kyll. vir.
Rubus, ſaxatilis, *foliis ternatis, flagellis nudis reptantibus herbaceis.* Linn. Sp. pl. II. 708. Ström Sundm. I. 120.

Nor-

Norvegis *Teyebær, Tægebær.* Pontopp. H. N. N. I. 212. Oecon. Magaz. II. 183. Danis *Fruebær.* Kyll. Germ. *Bocksbær.* Trag. *Steinbeer.* Cluſ.
Locus. Frequens in Norvegia in paſcuis pratisque ad acervos lapidum. In Dania rarior, circa *Fridrichsdal.*

Tab. CXXXV.

Cochlearia folio ſubrotundo. C. B. P. 110. Dod. pemt. 594. S. Paull. Fl. D. 206. 56. Kyll. vir.
Cochlearia, officinalis, *foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſinuatis.* Linn. Sp. pl. II. 903. Ström Sundm. I. 82.
Cochlearia officinalis.
Vulgo *Cochlearie,* Dan. *Strandſkeeurt, Skörbugsurt.* Germ. *Löffelkraut.*
Locus. In totius Norvegiæ littoribus, etiam in Dania paſſim.

Tab. CXXXVI.

Anblatum. Cord. Hiſt. 89. Dodon. pemt. 553.
Orobanche radice dentata major. C. B. P. 88. Kyll. vir. S. Paull. Fl. D. 19. 7.
Dentaria aphyllos. Cluſ. pann. 452. Blakw. t. 430.
Squamaria. Riv. monop. t. 89. Hall. Helv. 611.
Lathræa, ſquamaria, *caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido.* Linn. Sp. pl. II. 844. fl. ſv. 550.
Danice *Tandurt.* Germ. *Schuppenwurtz, Anblat, Freyſamkraut,* St. *Georgenwurtz.*
Locus. Rarior in umbra denſa ſylvarum ad radices arborum, e. g. *Fortun* in *Jægersburgenſi* ſylva.

Tab. CXXXVII.

Ophris. Fuchſ. Hiſt. 566. Geſn. Schmied. op. I. t. 12. f. 103.
Ophrys bifolia. C. B. P. 87. Kyll. Vir.
Ophrys, ovata, *bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido.* Linn. Sp. pl. II. 1340. Hall. Helv. 277. Ström Sundm. I. 108.
Dan. *Toblad.* Germ. *Zweyblad, Rattenſchwantz.* Rupp.
Locus. Paſſim in Norvegia, copioſius in Dania, in ſylvis humidis & pratis ſylveſtribus, copioſiſſime in *Brentved.*

Tab. CXXXVIII.

Millefolium aquaticum lenticulatum. C. B. P. 141. Kyll. Vir.
Lentibularia. Riv. monop. 78. Linder. Hort. Alſ. 242. t. 11. Dill. Giſſ. app. t. 6. Hall. Helv. 612.
Utricularia, vulgaris, *nectario conico, ſcapo paucifloro.* Linn. Sp. pl. II. 26. Goüan Monſp. 14.
Locus. Paſſim in foſſis & aquis ſtagnantibus, circa Hafniam in plerisque lacunis a ceſpite effoſſo.

Tab. CXXXIX.

Uva verſa. Dorſten. 304.
Aconitum pardalianches. Fuchſ. 87.
Herba Paris. Dod. 444. S. Paull. Fl. Dan. 66. 54.
Solanum quadrifolium bacciferum. C. B. P. 167. Kyll. Vir.
Paris quadrifolia. Linn. Sp. pl. II. 526. Hall. Helv. 412. Ström Sundm. I. 111.
Danice. *Etbær, Ulfsbær, Fireblad, Uleblad,* Kyll. *Troldbær,* Ström. Liſterenſibus *Rævebær, Svinebær.* Germ. *Einbær, Wolfsbær,* Rupp.
Locus. Paſſim copioſe in nemoribus Daniæ & Norvegiæ.

Tab. CXL.

Ranunculi quarti ſpecies lutea. Fuchſ. 162.
Ranunculus nemoroſus luteus. C. B. P. 178. Kyll. Vir.
Anemone, ranunculoides, *ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis ſubrotundis, caule ſubbifloro.* Linn. Sp. pl. II. 762. fl. ſv. 486. Hall. Helv. 329.
Locus. Vulgaris in nemoribus Siællandiæ, e. g. *Charlottenlund, Bernſtorff.*

Tab. CXLI.

Hypericum ſupinum tertium minimum. Cluſ. Hiſt. CLXXXI.
Hypericum minus ſupinum. C. B. P. 279. Kyll. Vir.
Hypericum humifuſum, foliis perforatis, punctis in margine nigris notatis. Hall. Helv. 360.
Hypericum foliis ovatis, caulibus ſupinis. Guett. Stamp. 2. 174.
Hypericum, humifuſum, *floribus trigynis axillaribus ſolitariis, caulibus ancipitibus proſtratis filiformibus, foliis glabris.* Linn. Sp. pl. II. 1105. fl. ſv. 681.
Locus. Rarius in Dania, *Soebrohuus, Silleröd, Langöe* prope *Kallehave,* in campis apricis.

Tab. CXLII.

Burſa paſtoris alpina hirſuta. C. P. Prodr. 51. Pin. 108.
Draba, ſtellata, *foliis hirtis, integerrimis dentatisque; ſcapo ſubunifolio; ſiliculis oblongis, erectis.* Jacq. Vind. 256. t. 4. f. 3.
Draba, hirta, *ſcapo unifolio, foliis ſubhirſutis, ſiliculis obliquis pedicellatis.* Linn. Sp. pl. II. 897.
Locus. In Norvegiæ alpe *Dovrefield* prope *Fogſtue.*

Tab. CXLIII.

An? *Draba,* pyrenaica, *ſcapo nudo foliis cuneiformibus trilobis.* Linn. Sp. pl. II. 896. Jacq. Vind. 255. Allion. pedem. t. 6. f. 1.
Locus. Prope *Olai Porte,* in *Vang* dynaſtiæ *Walders,* in rupibus.

Tab. CXLIV.

Ranunculus repens, flore in caule ſingulari, foliis varie ſectis. Amm. ruth. n. 107. t. 13. f. 2.
Ranunculus, lapponicus, *foliis tripartitis lobatis obtuſis, caule ſubnudo unifloro.* Linn. Sp. pl. II. 778. fl. lapp. 231. t. 3. f. 4. fl. ſv. 503.
Locus. Copioſe circa *Sulutinde* in *Filefield* Norvegiæ, loco paludoſo, ceterum rarior.

Tab. CXLV.

Melampyrum floribus ſparſis ſeſſilibus, binatis, foliis omnibus integris. Hall. Helv. 627.
Melampyrum, ſylvaticum, *floribus ſecundis lateralibus: conjugationibus remotis, corollis hiantibus.* Linn. Sp. pl. II. 843. Ström Sundm. I. 106.
Locus. Paſſim in ſylvis Norvegiæ meridionalis.

Tab. CXLVI.

Fucus marinus tertius. Dod. pemt. 480.
Fucus marinus nodoſus. C. B. P. 365. Kyll. Vir. Ray. Syn. III. 48.
Fucus maritimus, veſiculis majoribus ſingularibus per intervalla diſpoſitis. Moriſ. Hiſt. III. 647. f. 15. t. 8. f. 2.
Fucus, nodoſus, *caule compreſſo dichotomo, medio ramorum in veſiculam dilatato.* Linn. Sp. pl. II. 1628. Guett. Stamp. II. 401. Ström Sundm. I. 90.
Sundmörenſibus *Knoppetang.*
Locus. Ad littora maris, potiſſimum oceani Norvegiam alluentis.

Tab. CXLVII.

Ophiogloſſum. Fuchſ. 577.
Ophiogloſſum vulgatum. C. B. P. 354. S. Paull. Fl. D. 96. 84. Kyll. Vir. Plum. filic. XXXVI. t. B. f. 5.
Ophiogloſſum, vulgatum, *fronde ovata.* Linn. Sp. pl. II. 1518. Hall. Helv. 131. Goüan Monſp. 523.
Danice *Slangetunge.* Germ. *Schlangenzunge, Natternzunge.*
Locus. Rarius in Dania, in pratis, omnium copioſiſſime in Inſula *Giæholmen* prope *Gavnöe* in ſinu Neſtvedienſi. *Mannemarken* in Inſula *Mona* prope Promontorium *Klint.*

Tab. CXLVIII.

Cardamine caule & foliis hirſutis. Hall. Helv. 558. Gœtt. 252.
Cardamine, hirſuta, *foliis pinnatis, floribus tetrandris.* Linn. Sp. pl. II. 914. Goüan. Monſp. 324.
Locus. Circa *Chriſtiania,* & in *Möensklint, Maglevandsfallet.* Locis irriguis, inter prærupta.

Tab. CXLIX.

Hieracium primum latifolium. Cluſ. pann. 640. Hiſt. CXXXIX.
Hieracium alpinum latifolium hirſutie incanum flore magno. C. B. P. 128. Kyll. vir. p. 70. n. 5?
Hypochoeris foliis hirſutis, ovatis, ſæpe dentatis, caule plerumque unifloro. Hall. Helv. 760. cf. t. 24.
Hypochœris, maculata, *caule ſubnudo: ramo ſolitario, foliis ovato oblongis integris dentatis.* Linn. Sp. pl. II. 1140. Ström. Sundm. I. 98.
Locus. Paſſim in Daniæ pratis editis, vulgaris in Norvegiæ provincia Chriſtianſandenſi.

Tab. CL.

Hieracium tertium. Dod. 639.
Hieracium longius radicatum. Lob. Ic. 238.
Hypochoeris dentibus foliorum rectangulis, caule nudo ramoſo. Hall. Helv. 759.

Hypo-

Hypochoeris, radicata, *foliis runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo lævi, pedunculis ſquamoſis.* Linn. Sp. pl. II. 1140. Scan. 225.

Locus. Paſſim in pratis paſcuisque Daniæ & Norvegiæ meridionalis.

Tab. CLI.

Muſcofungus coralloides terreſtris denſe ramificatus cinereus & veluti incruſtratus Norvegicus. Moriſ. Hiſt. III. 633. ſ. 15. t. 7. f. 12.

Lichen alpinus glaucus ramoſus botryoides. Scheuchz. It. 137. t. 19. f. 4.

Coralloides criſpum & botryoides alpinum. Dill. Muſc. 114. t. 17. f. 33.

Lichen, paſchalis, *fruticuloſus ſolidus tectus foliolis cruſtaceis.* Linn. Sp. pl. II. 1621. fl. ſv. 1120. Ström Sundm. I. 103.

Locus. Vulgaris in alpibus Norvegiæ, & in ſylvis.

Tab. CLII.

Polygonatum platyphyllum. Cluſ. pann. 265. *latifolium I.* Hiſt. 275. S. Paull. Fl. D. 108. 96.

Polygonatum latifolium maximum. C. B. P. 303. Kyll. vir.

Polygonatum caule cernuo longiori, alis multifloris. Hall. Gœtt. 77. Helv. 287.

Convallaria, multiflora, *foliis alternis amplexicaulibus caulo tereti, pedunculis axillaribus multifloris.* Linn. Sp. pl. II. 452. Goüan. Monſp. 177.

Sigillum Salomonis. Offic.

Danice *Hvidroed, Verkurt, Salomons Signet, Bukebær.* Kyll. Germ. *Weiſswurtz.*

Locus. Paſſim in ſylvarum rupibus.

Tab. CLIII.

Pulſatilla vulgaris. Lobel. Ic. 281. Cluſ. Hiſt. 246. Kyll. vir. S. Paull. Fl. D. 115. 103.

Pulſatilla folio craſſiore & majori flore. C. B. P. 177. Helw. pulſ. 62. t. 8.

Anemone, pulſatilla, *pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis.* Linn. Sp. pl. II. 759.

Danice *Blaaveyrurt, blaa Koebielde, blaa Oxeöre.* Kyll. Germ. *Küchenſchelle, Oſterſchelle.* Rupp.

Locus. Paſſim in Dania in collibus & campis ſiccis apricis.

Tab. CLIV.

Equiſetum ſ. Hippuris muſcoſus ſub aqua repens. Plukn. t. 193. f. 6.

Chara major caulibus ſpinoſis. Vaill. Act. Pariſ. 1719. p. 18. t. 3. f. 3. Ray. Syn. III. 132.

Chara, hiſpida, *aculeis caulinis capillaribus confertis.* Linn. Sp. pl. II. 1624. fl. ſv. 1133.

Locus. In foſſis turfaceis circa *Backendrup* Siællandiæ.

Tab. CLV.

Muſcus Iſlandicus purgans. Borrich. Act. Hafn. 1671. p. 126.

Lichen pulmonarius minor anguſtifolius, ſpinis tenuiſſimis ad margines ornatus. Mich. Gen. 85. t. 44. f. 4.

Lichenoides rigidum Eryngii folia referens. Dill. Muſc. 209. t. 28. f. 111. 112.

Lichen, Iſlandicus, *foliaceus adſcendens laciniatus, marginibus elevatis ciliatis.* Linn. Sp. pl. II. 1611. fl. ſv. 1085.

Vulgo *Iſlands Moſſe.*

Locus. In omnibus Norvegiæ alpibus & ſylvis acerofis ſterilibus, e. g. copioſiſſime in *Meelhuusfield* Nidroſienſis Provinciæ, paſſim etiam in Daniæ ericetis, & in Bornholmia, ſed parca copia & varietas minor.

Tab. CLVI.

Alſinaſtrum ſerpillifolium flore albo tetrapetalo. Vaill. Pariſ. 5. t. 2. f. 2.

Hydropiper. Buxb. Cent. II. p. 35. t. 37. f. 3.

Elatine, Hydropiper, *foliis oppoſitis.* Linn. Sp. pl. II. 527. Holm Fl. D.

Locus. Rarius ſub aqua circa *Fridrichsdal, Fridrichsberg.*

Tab. CLVII.

Gramen avenaceum, paniculatum, alpinum, foliis capillaceis, brevibus, locuſtis purpureo-argenteis, ſplendentibus & ariſtatis. Scheuchz. agroſt. 216. t. IV.

Aira, flexuoſa, *foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuoſis.* Linn. Sp. pl. II. 96. fl. ſv. 71. Stillingfleet miſc. tracts. 376 t. 4. Hudſ. fl. angl. 30. Schreber Gram. 40. Ström Sundm. I. 69.

Sundmörenſibus *Enghavre.*

Locus. Vulgaris in Norvegia in ericetis, locisque ſterilibus, in Dania rarior.

Tab. CLVIII.

Cyperiodes alpinum, pulchrum, foliis caryophyllæis, ſpicis atris & tumentibus. Scheuchz. agr. 481. t. 11. f. 1.

Carex, atrata, *ſpicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis.* Linn. Sp. pl. II. 1386. fl. ſv. 849.

Locus. In alpibus Norvegiæ paſſim, e. g. in monte qui templo in *Opdal* proximus adjacet.

Tab. CLIX.

Carex, ſaxatilis, *ſpicis tribus ovatis ſeſſilibus alternis; maſcula oblonga.* Linn. Sp. pl. II. 1385. fl. ſv. 848.

Locus. In alpibus Norvegiæ paſſim.

Tab. CLX.

Gramen loliaceum, ſpica longiore, ſ. Lolium Dioſcoridis. C. B. P. 9. theatr. 121. Kyll. Vir. Scheuchz. agr. 31. Hall. Helv. 206.

Lolium, temulentum, *ſpica ariſtata: ſpiculis compreſſis ariſtatis.* Linn. Sp. pl. II. 122. Goüan Monſp. 55. Schreb. Gram. 50.

Danice *Heyregræſs, Heyre.* Germ. *Lülch, Treſpen.*

Locus. Paſſim in agris humidioribus, rarior circa Hafniam, e. g. *Söebrohuus.*

Tab. CLXI.

Gramen parvum, paniculatum, alpinum, panicula ſpadicea, ariſtatum. Scheuchz. 140. t. IV.

Varietas *agroſtis caninæ*. Linn. uti omnes Scheuchzerianæ p. 140--143. n. 1--4.

Picta eſt hæc icon in Norvegia, ubi planta ſæpius obvia fuit in lacunis inter ſcopulos interjectis.

Tab. CLXII.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis. Plukn. t. 34. f. 1. Monti Prodr. Bon. t. 2. f. 1. Moriſ. Hiſt. III. ſ. 8. t. 1. f. 6.

Gramen montanum avenaceum, locuſtis muticis tumentibus, piloſum. Scheuchz. agr. 170.

Feſtuca, decumbens, *panicula erecta, ſpiculis ſubovatis muticis, calyce floſculis majore, culmo decumbente.* Linn. Sp. pl. II. 111. fl. ſv. 93.

Locus. Rarius in Norvegia & Dania, *Bornholm Almingen*, prope *Soröe*, ſemper locis ſiccis ſterilibus.

Tab. CLXIII.

Gramen montanum panicula ſpadicea delicatiore. Scheuchz. agr. 129.

Agroſtis, capillaris, *panicula capillari patente, calycibus ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis.* Linn. Sp. pl. II. 93. Scopol. carn. *Alopecurus* 3. p. 184.

Locus. Paſſim in Norvegiæ pratis apricis.

Tab. CLXIV.

Gramen loliaceum corniculatum. Scheuchz. agr. 35. Hall. Helv. 208.

Bromus, ſpica ſtricta diſticha, ſpiculis alternis ſolitariis ſeſſilibus decemfloris oblongis, corollis ſubariſtatis. Goüan Monſp. 51.

Bromus, pinnatus, *ſpiculis alternis ſubſeſſilibus teretibus, culmo indiviſo.* Linn. Sp. pl. II. 115. fl. ſv. 100. Scopol. carn. 200. 201. Schreb. Gram. 49.

Locus. In collibus *Bornholmiæ* circa *Svanike.*

Tab. CLXV.

Gramen avenaceum elatius juba longa ſplendente. Scheuchz. agr. 239.

Avena, elatior, *calycibus bifloris; floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato.* Linn. Sp. pl. II. 117. Goüan Monſp. 53. Schreb. Gram. 50.

Locus. Paſſim locis ſiccis & inter ſaxa, potiſſimum in ſcopulis maritimis Norvegiæ.

Tab. CLXVI.

Gramen cyperoides ſpica ſimplici caſſa. Scheuchz. agr. 497. t. II. f. 9.

Ulva ſpica ſolitaria oblonga. Hall. Helv. 242.

Carex, pulicaris, *ſpica ſimplici androgyna: ſuperne maſcula, capſulis divaricatis retroflexis.* Linn. Sp. pl. II. 1380. fl. ſv. 834.

Locus. Paludes limoſæ.

Scirpus multicaulis. Sm. –

Tab. CLXVII.

Juncus minimus ſpica breviore ſquamoſa ſpadicea. Scheuchz. agr. 364. t. 7. f. 19.

v. t. 287. *Scirpus*, acicularis, *culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ovata terminali bivalvi, ſeminibus nudis.* Linn. Sp. pl. II. 71. Hall. Helv. 249.

Locus. Ad ripas lacuum & paludum.

Tab.

Tab. CLXVIII.

Carex, capillaris, *ſpicis pendulis: maſcula erecta, fœmineis oblongis diſtichis, capſulis nudis acuminatis.* Linn. Sp. pl. II. 1386. fl. ſv. 851.
Locus. Rarius in Norvegia, in Inſula *Sörherröe* Nordlandiæ.

Tab. CLXIX.

Struthiopteris. Cordi. 171. Thal. herc. 119.
Lonchitis norvegica major. Ray. Hiſt. III. 68.
Filicaſtrum ſeptentrionale & paluſtre. Amm. ruth. n. 252. Act. petrop. X. t. 18. Rupp. Hall. 343. Hall. Gœtt. 1.
Oſmunda, ſtruthiopteris, *frondibus pinnatis; pinnis pinnatifidis, ſcapo fructificante diſticho.* Linn. Sp. pl. II. 1522. fl. ſv. 935.
Locus. Paſſim in Norvegiæ ſylvis, ad alveos torrentum umbroſos, e. g. *Wennern* prope *Chriſtiania.*

Tab. CLXX.

Figura ſuperior minor.

Gramen junceum ſeu Holoſteum minimum paluſtre, capitulis quatuor longiſſimis filamentis donatis. Plukn. t. 35. f. 2. Moriſ. Hiſt. III. 230. ſ. 8. t. 9. f. 30. Raj. Syn. III. 316.
Plantago floribus fœmineis ſeſſilibus ad exortum ſcapi uniflori maris. Juſſ. Act. Pariſ. 1724. p. 131. t. 7.
Plantago, uniflora, *ſcapo unifloro.* Linn. Sp. pl. II. 167. fl. ſv. 135.
Locus. Paſſim copioſe in Inſula *Bornholmia* locis paludoſis arenoſis æſtate ſicceſcentibus, e. g. *Schmedehuſene* prope urbem *Rönne.*

Figura inferior major.

Subularia repens, foliis convexo planis. Dill. Muſc. 542. t. 81.
Locus. In Bornholmiæ lacu *Oelene*, cum Pilularia, copioſe, & in *Hammershuusſöe*, ſub aqua, florens ſub finem menſis Julii. Eſt certo Subularia Dillenii, etſi non liqueat, quid cornicula Dillenianæ figuræ ſibi velint. An Polypi fuerint?

Tab. CLXXI.

Pentaphylloides majus erectum, flore luteo, ternis foliis fragariæ inſtar hirſutis. Moriſ. Hiſt. II. 193. ſ. 2. t. 20. f. 2.
Trifolium norvegicum majus ſurrectum foliis ternatis flore luteo. Kyll. Act. Hafn. 1673. p. 346. c. fig.
Potentilla, norvegica, *foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus.* Linn. Sp. pl. II. 715. fl. ſv. 457.
Locus. In Norvegia, non vulgaris, circa *Næſs Hallingdaliæ* & *Elverum Oeſterdaliæ*, in agris arenoſis inter ſegetem.

Tab. CLXXII.

Sagitta major. Geſn. Schmied. op. I. t. 8. f. 72. Dod. pemt. 588. Lob. Ic. 301. 302 Kyll. vir. Dill. Giſſ. app. t. 4.
Sagittaria, ſagittifolia, *foliis ſagittatis acutis.* Linn. Sp. pl. II. 1410. fl. ſv. 869. Hall. Helv. 300. Gœtt. 87.
Danice, *Piilurt.* Kyll.
Locus. Paſſim in Siælandiæ lacubus & fluviis, in *Oerholm* in vicinia Hafniæ, copioſiſſime in fluvio prope *Herlufsholm.*

Tab. CLXXIII.

Hypericum campoclarenſe. Column. Ecphr. 73. t. 74.
Hypericum elegantiſſimum non ramoſum. J. B. III. 383. Ray. Syn. III. 343.
Hypericum foliorum ora punctata, calyce ſerrato. Hall. Helv. 361. Gœtt. 115.
Hypericum. Hill. Nat. Hiſt. II. 557. n. 13. t. 14.
Hypericum, montanum, *floribus tryginis, calycum ſerraturis glanduloſis, caule tereti erecto glabro, foliis ovatis.* Linn. Sp. pl. II. 1105. fl. ſv. 683. It. Weſtg. 213.
Locus. In *Bornholmia* circa *Svanike* & *Hammershuus*, in lateribus montium.

Tab. CLXXIV.

Anagallis luteo flore. Cluſ. pann. 493. Hiſt. CLXXXII.
Anagallis lutea nemorum. C. B. P. 252. Kyll. Vir.
Lyſimachia, nemorum, *foliis ovatis acutis, floribus ſolitariis, caule procumbente.* Linn. Sp. pl. II. 211. Hall. Helv. 481.
Danice *Guulgaaſcheel, Guularve.* Kyll.
Locus. In *Bornholmia* prope *Svanike* in valleculis inter præruptos ſcopulos interjectis, umbroſis.

Tab. CLXXV.

Phallus batavicus. Dalech. 1398.
Fungus fœtidus penis imaginem referens. C. B. P. 374. Kyll. Vir.
Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac ſumma parte umbilico pervio ornato. Mich. Gen. 201. t. 83.
Phallus; volva exceptus, capituli apice patulo. Gleditſch. Fung. 55.
Phallus primus. Schæffer. Fung. Ratisb. t. 196. 197. 198.
Phallus, impudicus, *volvatus ſtipitatus, pileo celluloſo.* Linn. Sp. pl. II. 1648.
Germ. *Gichtſchwamm, Hirſchbrunſt, Stertmorchel, Stinkſchwamm.* Gled. Schæff.
Locus. Paſſim in ſylvis ad truncos arborum, *Charlottenlund, Fridrichsthal.*

Tab. CLXXVI.

Fungus pene candidus prona parte erinaceus. J. B. III. 812.
Erinaceus eſculentus albus craſſus. Mich. Gen. 132. t. 72. f. 2. Hall. Helv. 31.
Hydnum ſecundum. Schæffer. fung. ratisb. t. 140.
Hydnum, imbricatum, *ſtipitatum, pileo convexo imbricato.* Linn. Sp. pl. II. 1647.
Locus. Semel inveni prope *Næſs Hallingdaliæ* in ſylva.

Tab. CLXXVII.

Centunculus. Dill. Giſſ. 161. app. 111. t. 5.
Anagallis paludoſa minima. Vaill. Pariſ. 12. t. 4. f. 2.
Anagallidaſtrum exiguum, foliis lanceolatis alternis. Mich. Gen. 14. t. 18.
Centunculus, minimus. Linn. Sp. pl. II. 169.
Locus. Paſſim circa Hafniam, ante Portam orientalem *ved Batterien,* prope *Charlottenlund,* locis humidis arenoſis.

Tab. CLXXVIII.

Radiola vulgaris ſerpillifolia. Raj. Syn. III. 345. t. 15. f. 3. Dill. Giſſ. app. 126. t. 7.
Chamælinum vulgare. Vaill. Par. 33. t. 4. f. 6.
Linocarpum, ſerpylli folio, multicaule & multiflorum. Mich. Gen. 23. t. 21.
Linum, radiola, *foliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandis tetragynis.* Linn. Sp. pl. II. 402.
Locus. Paſſim in Dania, in glareoſis, humidis, tenuiſſimo gramine veſtitis.

Tab. CLXXIX.


Cyperus minimus, panicula ſparſa nigricante. Scheuchz. agroſt. 384.
Cyperus, fuſcus, *culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis ſimplicibus inæqualibus, ſpicis confertis linearibus.* Linn. Sp. pl. II. 69. Jacq. Vind. 206.
Locus. Paſſim in Siællandiæ pratis inundatis, circa *Friedensburg, Fridrichsdal, Chriſtiansholm.*

Tab. CLXXX.

Coralloides montanum, fruticuli ſpecie, ubique candicans. Dill. Muſc. 107. t. 16. f. 129.
Lichen, rangiferinus alpeſtris, *fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus.* Linn. Sp. pl. II. 1620. Ström Sundm. I. 103.
Norvegis *Reensdyrmoſſe.*
Locus. Vulgatiſſimus in omnibus alpibus & ſylvis ſubalpinis ſterilibus.

HAFNIÆ, typis Fratrum C. & A. PHILIBERT.
Proſtat apud Auctorem & Bibliopolas Fratres Philibert & Viduam Mumme.

Flora Danica Tab. CXXI.












Flora Danica Tab. CXXVI.



Flora Danica Tab. CXXVII.



Flora Danica Tab. CXXVIII.






Flora Danica Tab. CXXX.



Flora Danica Tab. CXXXI.



Flora Danica Tab. CXXXII.









Flora Danica Tab. CXXXVI.



Flora Danica Tab. CXXXVII.







Flora Danica Tab. CXL.



Flora Danica Tab. CXLI.






Flora Danica Tab. CXLIII.



Flora Danica Tab. CXLIV.










Flora Danica Tab. CXLVIII.



Flora Danica Tab. CXLIX.





Flora Danica Tab. CLI.



Flora Danica Tab. CLII.



Flora Danica Tab. CLIII.



Flora Danica Tab. CLIV.




Flora Danica Tab. CLV.



Flora Danica Tab. CLVI.




Flora Danica Tab. CLVII.





Flora Danica Tab. CLIX.






Flora Danica Tab. CLXI.




Flora Danica Tab. CLXII.







Flora Danica Tab. CLXV.



Flora Danica Tab. CLXVI.



Flora Danica Tab. CLXVII.



Flora Danica Tab. CLXVIII.



Flora Danica Tab. CLXIX.








Flora Danica Tab. CLXXII.









Flora Danica Tab. CLXXV.



Flora Danica Tab. CLXXVI.







Flora Danica Tab. CLXXIX.



Flora Danica Tab. CLXXX.

